

البحث السابع 2016

معدلات الإصابة والتنقبؤ السريري لنتائج شلل بيل ، مدينة القصير ، محافظة البحر الأحمر ، مصر.

المشاركون فى البحث:

- ا.د. حمدي نجيب التلاوي أستاذ الأمراض العصبية-جامعة أسيوط
ا.د. وفاء محمد فرغلي أستاذ الأمراض العصبية-جامعة أسيوط
ا.د غيداء احمد شحاته أستاذ الأمراض العصبية- جامعة أسيوط
د.رضا بدري أستاذ مساعد الأمراض العصبية- جامعة أسيوط
د.محمد حسن مدرس الأمراض العصبية- جامعة أسيوط
د. محمد احمد حامد مدرس الأمراض العصبية- جامعة أسيوط
د.خالد اسامه محمد مدرس الأمراض العصبية- جامعة أسيوط
د.سيد صبحي سيد بدوي أستاذ مساعد الامراض العصبية- جامعه الفيوم
ا.د طارق احمد راجح أستاذ الامراض العصبية- جامعة أسيوط
د.نبيل احمد متولي أستاذ مساعد الامراض العصبية -جامعة الازهر اسيوط
ا.د محمد عبد الفتاح يحيى أستاذ الامراض العصبية- جامعه المنيا
ا.د محمد عبد الفتاح يحيى أستاذ الامراض العصبية- جامعه المنيا
ا.د وائل طلعت سليمان أستاذ الامراض العصبية -جامعة المنيا

الملخص العربى:

يعتبر شلل بيل (BP) أحد أكثر الأسباب شيوعاً لضعف الوجه أحادي الجانب. من خلال هذه الدراسة استهدفنا تقدير حدوث BP في مدينة القصير ، محافظة البحر الأحمر ، مصر.

المرضى والطرق: تم تنفيذ مشروع لتقييم وبائيات الاضطرابات العصبية الكبرى. تم فحص ما مجموعه ٣٣٢٨٥ مريضاً من خلال مسح من الباب إلى الباب من قبل ثلاثة أخصائيين في علم الأعصاب و ١٥ باحث اجتماعي. تم إخضاع جميع المرضى لتاريخ تفصيلي وفحص دقيق من الناحية العصبية عن طريق استبيان خاص تم تصميمه لهذه الدراسة. **النتائج** في غضون عام واحد ، تم تشخيص ٢٧ مريضاً مع BP. وقد أدى هذا إلى حدوث معدل حدوث ٩,٩ / ١٠٠٠٠٠ من السكان (الذين تتراوح أعمارهم بين ٩ سنوات فما فوق). وكان معدل الإصابة أعلى في عدد الذكور من الإناث (٤,١١٦ و ٢,٨١ / ١٠٠٠٠٠ ، على التوالي). وأظهرت حالات الإصابة بالعمر المحدد لـ BP أن ذروتها كانت تتراوح بين ١٨ و ٦٠ سنة. حوالي ٧٨ ٪ من المرضى الذين يعانون من BP تعافى تماماً في غضون ٦ أشهر بعد بداية. لم يكن هناك فرق واضح بين المرضى الذكور والإناث. **استنتاج** كان معدل الإصابة ٩,٩ / ١٠٠٠٠٠ بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين ٩ سنوات فما فوق. كانت معظم الحالات المصابة أكثر من ١٨ عاماً وأقل من ٦٠ عاماً

