

تحسن الصفات المورفولوجية، الفسيولوجية والبيوكيميائية للكرديّة المنزّرع تحت مستويات ملوحة مختلفة باستخدام سليكات البوتاسيوم ومستخلص الصبار.

<p>Improvement of Selected Morphological, Physiological, and Biochemical Parameters of Roselle (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.) Grown Under Different Salinity Levels Using Potassium Silicate and Aloe saponaria Extract</p>	<p>عنوان البحث (إنجليزي)</p>
<p>علاء إدريس بدوي أبو سريع^١، محمد حسين حمدي روبي^٢، هيام مهدي^٣، نصر محمود أحمد عبده^٤، أميرة ممدوح الطحان^٥، محمد طلعت السعدوني^٦، خالد عباس الطرابيلي^٧، فتحي محمد عبده السعدوني^٨</p> <p>^١ قسم البساتين - كلية الزراعة - جامعة الفيوم - مصر ^٢ قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية - كلية الزراعة - جامعة الفيوم - مصر ^٣ قسم النبات - المركز القومي للبحوث - مصر ^٤ قسم الاراضي والمياه - كلية الزراعة - جامعة الفيوم - مصر ^٥ قسم الإنتاج النباتي - معهد بحوث زراعة الأراضي الجافة - مدينة البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، مصر ^٦ قسم الميكروبيولوجيا الزراعية، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق، مصر ^٧ قسم الأحياء، كلية العلوم، جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة ^٨ قسم النبات الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق - مصر</p>	<p>المشاركون</p>
<p>فردى اعتباري - مشترك مع آخرون من خارج التخصص - منشور في مجلة دولية متخصصة</p>	<p>حالة البحث</p>
<p>Plants, 11(4), 497; (2022) https://doi.org/10.3390/plants11040497</p>	<p>المجلة المنشور بها البحث</p>
<p>٣.٩٣٥</p>	<p>معامل التأثير للمجلة</p>
<p>ملخص البحث باللغة العربية:</p> <p>أجريت تجربتان ميدانيتان متاليتان في المزرعة التجريبية التابعة لكلية الزراعة بجامعة الفيوم، الفيوم، مصر، لدراسة التأثير الفردي والتفاعل المشترك لمعاملة الرش الورقي بمستخلص الصبار (Ae) و سيليكات البوتاسيوم (KSi) للتقليل من آثار الاجهاد الملحي على تطور و إنتاجية نباتات الكردية (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.). وقد استخدم كل من Ae و KSi بثلاثة معدلات: صفر٪ (كنترول)، ٠.٥ ٪ (٥ سم^٣ لتر^{-١})، و ١ ٪ (١٠ سم^٣ لتر^{-١})، وكذلك (صفر، ٦٠، ٣٠ جرام لتر^{-١}) على التوالي. تحت ثلاثة مستويات لملوحة التربة (التوصيل الكهربى لمستخلص عجينة التربة المشبعة): التربة العادية (S¹) (Ece < 4 dS/m)؛ التربة المتوسطة الملوحة (S₂) (Ece: 4-8 dS/m)؛ والتربة عالية الملوحة (Ece: 8-16 dS/m) (S₃). عند المستوى المنخفض لملوحة التربة تحققت أعلى المستويات لجميع الصفات المدروسة باستثناء درجة الحموضة، الكلوريد والصوديوم. المعاملة Ae بمعدل (٠.٥ ٪) أدت الى زيادة فى المحتوى الكلى للسكريات القابلة للذوبان، الأحماض الأمينية الحرة، البوتاسيوم، الأنثوسيانين، محتوى الكلوروفيل (SPAD)، قطر الساق، عدد الثمار، والوزن الطازج، في حين أن ١ ٪ من Ae أدى إلى أعلى طول للنبات، التمثيل الضوئى (FV/Fm)، مؤشر الأداء، المحتوى النسبى للماء، مؤشر ثبات الغشاء، البرولين، السكريات القابلة للذوبان، والحموضة. إضافة سليكات البوتاسيوم بمعدل ٣٠ أو ٦٠ جرام لتر^{-١} أدى الى زيادة كبيرة في هذه الصفات المذكورة أعلاه. كما زاد عدد ووزن الثمار الطازج لكل نبات بشكل معنوى للتفاعل بين Ae بنسبة ١ ٪ و KSi عند ٣٠ جرام لتر^{-١} في ظل ظروف التربة العادية.</p>	