

السيطرة الدماغية وعلاقتها بالضغوط النفسية لدى مريضات سرطان الثدي¹ إعداد

أد/ إيمان محمد صبري، د/ خلود عويس محمود، أ/ محمد ليسبي معوض

الملخص:

يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، حيث تعاني مريضة سرطان الثدي من تعدد المصادر المسببة للضغط النفسي باعتبارها تضم أكثر المواقف إثارة للضغط النفسي، وأشارت عدد من الدراسات كدراسة (نجلاء العلامي، 2018) ودراسة (محمد نوفل، 2007) الي أن العلاقة بين نصفي الدماغ الأيسر والأيمن علاقة تبادلية متكاملة، أي أن نصف الدماغ الأيمن يسيطر على وظائف النصف الأيسر من الجسم، والنصف الأيسر يسيطر على وظائف النصف الأيمن من الجسم، حيث يهدف البحث الي معرفة علاقة السيطرة الدماغية والضغوط النفسية لدى مريضات سرطان الثدي و تكونت العينة الاستطلاعية من تكونت من (50) مشاركة تراوحت أعمارهن ما بين 31 سنة إلى 60 سنة وتكونت العينة الأساسية من (50) مشاركة من مريضات سرطان الثدي، تراوحت أعمارهن ما بين أقل من 30 سنة إلى أكثر من 50 سنة، كما استخدم الباحثين عدة ادوات للحصول علي نتائج الدراسة مثل :

استبان البيانات الديموغرافية و مقياس السيطرة الدماغية ومقياس الضغوط النفسية وكانت أهم النتائج هي :

"توجد علاقه بين الضغوط النفسية والسيطرة الدماغية لدى مريضات سرطان الثدي". و توجد فروق في درجات أنماط السيطرة الدماغية والضغوط النفسية تعزى لمتغير العمر لدى مريضات سرطان الثدي". و توجد فروق في درجات أنماط السيطرة الدماغية والضغوط النفسية تعزى لمتغير مدة العلاج لدى مريضات سرطان الثدي. توجد فروق في درجات أنماط السيطرة الدماغية والضغوط النفسية تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية لدى مريضات سرطان الثدي.