

قلق الموت و علاقته بالصلابة النفسية لدى مرضي الجلطات الدماغية

إعداد/

د. خلود عويس محمود

مدرس علم النفس كلية الآداب – جامعة الفيوم

ملخص:

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العلاقة بين قلق الموت والصلابة النفسية لدى مرضي الجلطات الدماغية، والكشف عن الفروق في قلق الموت تبعاً لمتغير (الجنس، العمر، مدة الإصابة) لدى مرضي الجلطات الدماغية، وكذلك الكشف عن الفروق في الصلابة النفسية تبعاً لمتغير (الجنس، العمر، مدة الإصابة) لدى مرضي الجلطات الدماغية، وتكونت عينة الدراسة من (42) مشاركاً (27 ذكراً، و 15 أنثى) من مرضي الجلطات الدماغية تراوحت أعمارهم ما بين 40 إلى 70 عام بمتوسط عمري (58,33)، وانحراف معياري ($\pm 7,90$)، وتمثلت أدوات الدراسة في استمارة البيانات الأولية إعداد الباحثة، ومقياس قلق الموت إعداد أحمد عبد الخالق، 1996، ومقياس الصلابة النفسية إعداد عماد مخيمر، 2003 وأشارت أبرز النتائج إلى:

- 1- وجود علاقة ارتباطية سالبة دالة إحصائياً بين قلق الموت بأبعاده الأربعة (الخوف من الموتى والقبور، الخوف مما بعد الموت، الخوف من الأمراض المميتة، الإنشغال بالموت وأفكاره) والصلابة النفسية بأبعاده الثلاثة (الالتزام، التحكم، التحدي) لدى مرضي الجلطات الدماغية.
- 2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الذكور والإناث في متغير قلق الموت بأبعاده الأربعة وكانت الفروق لصالح الإناث.
- 3- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الذكور والإناث في متغير الصلابة النفسية بأبعاده الثلاثة وكانت الفروق لصالح الذكور.
- 4- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعات الدراسة الثلاث تبعاً لمتغير العمر في متغير قلق الموت بأبعاده الأربعة لدى مرضي الجلطات الدماغية.
- 5- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعات الدراسة الثلاث تبعاً لمتغير العمر في متغير الصلابة النفسية بأبعاده الثلاثة لدى مرضي الجلطات الدماغية.

6- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعات الدراسة الأربعة تبعاً لمتغير مدة الإصابة في متغير قلق الموت بأبعاده الأربعة لدى مرضي الجلطات الدماغية.

7- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعات الدراسة الأربعة تبعاً لمتغير مدة الإصابة في متغير الصلابة النفسية بأبعادها الثلاثة لدى مرضي الجلطات الدماغية.

الكلمات المفتاحية: قلق الموت – الصلابة النفسية- الجلطات الدماغية.