

تقييم كفاءة التسكين وتأثر عضلة الحجاب بين مجموعتين من المرضى،
الأولى جرى الحقن حول الضفيرة العصبية للساعد أسفل عظمة الترقوة
بالإضافة للحقن حول العصب الأعلى لعظم اللوح. والثانية جرى الحقن
حول الضفيرة العصبية للساعد بين مجموعة عضلات سكالين بالرقبة
للمرضى الذين يخضعون لإجراء جراحات إصلاح عضلة الكفة المدورة
بواسطة منظار الكتف: دراسة سريرية على عينة موزعة عشوائيا ومعتمة
للمراقب الفاحص.

رساله

توطئة للحصول على درجة الدكتوراه فى التخدير وعلاج الالم والعنايه المركزة

مقدمه من

فاطمه الزهراء عمر محمود

كلية الطب

جامعه الفيوم

٢٠٢٠

تقييم كفاءة التسكين وتأثر عضلة الحجاب بين مجموعتين من المرضى، الأولى
يجرى الحقن حول الضفيرة العصبية للساعد أسفل عظمة الترقوة بالإضافة للحقن
حول العصب الأعلى لعظم اللوح. والثانية يجرى الحقن حول الضفيرة العصبية
للساعد بين مجموعة عضلات سكالين بالرقبة للمرضى الذين يخضعون لإجراء
جراحات إصلاح عضلة الكفة المدورة بواسطة منظار الكتف: دراسة سريرية على
عينة موزعة عشوائيا ومعتمدة للمراقب الفاحص

رسالة

توطئة للحصول على درجة الدكتوراه فى التخدير وعلاج الالم والعنايه المركزة

مقدمه من

فاطمه الزهراء عمر محمود

ماجستير التخدير وعلاج الالم والعنايه المركزة

تحت اشراف

ا.م/جوزيف مكرم بطرس

استاذ مساعد تخدير-كلية الطب-جامعة الفيوم

د / محمد محمد صفاء الدين

مدرس العظام-كلية الطب-جامعة الفيوم

د/ صفاء جابر رجب

مدرس التخدير – كلية الطب- جامعه الفيوم

كلية الطب

جامعة الفيوم

٢٠٢٠

ملخص الرسالة

عملية منظار اصلاح الكفة المدوة من احدى العمليات الجراحية التى تسبب الم شديد بعد العملية خصوصا اول ٤٨ ساعة بعد العملية، ان تخدير الاعصاب بين عضلات الاسكاليين يسكن هذا الالم الناتج عن العملية الا ان هذا التخدير بين العضلتين يخدر ايضا عصب الحجاب مما يؤثر على تنفس المريض مما يجعله غير ملائم لمرضى الجهاز التنفسى

كما ان الجمع بين تخدير الاعصاب تحت الترقوة والاعصاب فوق اللوح الكتفى يسكن ايضا الالم الناتج عن عمليات الكتف ولا يؤثر على عصب الحجاب وهذا خاضع للدراسة والتأكيد

الهدف من الدراسة : هو ايجاد طرق اخرى لتسكين الم الكتف ولايؤثر على عصب الحجاب

بعد الحصول على موافقه من المرضى باجراء البحث عليهم يتم توزيعهم عشوائيا فى اى من المجموعتين

مجموعة أ : تضم ٣٣ مريضا سوف يتم تخديرها بوضع المواد المخدرة بين العضلتين الاخمعيتين ثم يتم تخديرهم كليا

مجموعة ب: تضم ٣٣ مريضا سوف يتم تخديرهم بوضع المواد المخدرة تحت الترقوة وفوق اللوح الكتفى ثم يتم تخديرهم كليا

وسيقارن بين المجموعتين من حيث كمية المورفين المستهلكة من قبل المرضى خلال اول ٢٤ ساعة وكذلك تحديد حدوث شلل مؤقت فى عصب الحجاب وكفاءة كل من الطريقتين فى تسكين الام بعد عملية منظار الكتف. كما يتم قياس كمية المخدرات المعطاة للمريض اثناء التخدير الكلى وكذلك يتم قياس وقت العملية الجراحية