

## البحث السابع

- عنوان البحث باللغة العربية: حقن سلفات الماغنيسيوم في العضلة الصدرية الرئيسية لتسكين الم ما بعد استئصال الثدي.  
دراسة عشوائية محكومة.

- عنوان البحث باللغة الإنجليزية:

- نوع البحث : مشترك غير مشتق من رسالته علميه ولم يسبق تقييمه.

- مكان و تاريخ النشر :

Research and Opinion in Anesthesia & Intensive Care

February 2021

- المشاركون في البحث بالترتيب حسب النشر:

١-د. سهير ميجالا

مدرس التخدير والرعاية المركزه كلية الطب جامعة المنيا.

٢-د. عمرو عبدالرازق

مدرس التخدير والرعاية المركزه كلية الطب جامعة المنيا.

٣-د. مدحت منير سليمان

جراحه الاورام المعهد القومى اورام المنيا

٤-د. محمد عوض السعيد احمد.

مدرس التخدير والرعاية المركزه كلية الطب جامعة الفيوم.

## **الملخص باللغة العربية:**

**الخلفية:**

سرطان الثدي يعتبر اكثرا السرطانات انتشارا بين السيدات في مصر. الحقن الموضعى فى مكان العملية سهل ولكنه غير كاف لتسكين الالم بعد عملية استئصال الثدي. سلفات الماغنيسيوم يعمل على تثبيط الالم عن طريق مناهضة مستقبلات موجودة في العضلات والمفاصل والجلد. نسعى من خلال هذه الدراسة مقارنة الحقن التقليدى فى الجرح مقابل حقن الماغنيسيوم فى العضلة الصدرية الرئيسية فى تسكين الالم ما بعد عملية استئصال الثدي.

**اساليب:**

شملت هذه الدراسة ٧٥ سيدة ممن ستحرجى لهن عملية استئصال ثدي لوجود سرطان . تم تقسيمهم الى ٣ مجموعات متساوية بطريقة عشوائية. مجموعة M تم حقن ماغنيسيوم في العضلة الصدرية الرئيسية و بيوبيفاكين تحت الجلد.اما مجموعة B تم حقن محلول ملح في العضلة الصدرية الرئيسية و بيوبيفاكين تحت الجلد.اما مجموعة C تم حقن حقن محلول ملح في كل من العضلة الصدرية الرئيسية و تحت الجلد. تم قياس مستوى الالم اثناء الراحة و اثناء تحريك الذراع ناحية العملية ورفعه لاعلى. ايضا ملاحظة وقت اول طلب لمسكناط اضافية وكمية المورفين المستهلكة خلال ٤ ساعه ونسبة حدوث اي اثار جانبية.

**النتائج:**

لوحظ ان مستوى الالم عامه في المجموعة M اقل من باقى المجموعات اثناء الراحة وايضا اثناء تحريك الذراع ناحية العملية. الوقت حتى طلب مزيد من المسكنات كان اطول في المجموعة التي تم حقن الماغنيسيوم في العضلة عن باقى المجموعات وايضا كمية المسكنات من المورفين اقل من باقى المجموعات. وبالتالي اقل نسبة حدوث اثار جانبية مثل القيء.

**الخلاصة:**

حقن سلفات الماغنيسيوم في العضلة الصدرية الرئيسية لتسكين الالم ما بعد استئصال الثدي طريقة بسيطة وامنة وتتوفر مستوى جيد من تسكين الالم اثناء الراحة وايضا اثناء تحريك الذراع افضل من حقن البيوبيفاكين في الجرح فقط دون حقن العضلة. وهذا يقلل من استخدام المسكنات الافيونية وبالتالي يقلل من اثارها الجانبية.