

الخصائص والعوامل التنبؤية لشدة المرض لدى المرضى المقيمين بالمستشفيات المصابين

بفيروس SARS-CoV-2 في محافظة الفيوم ، مصر: دراسة متعددة المراكز

الملخص العربي

الخلفية: يُعد وباء فيروس كورونا ٢- (SARS-CoV-2) المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة مشكلة صحية خطيرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مصر ، وبالتالي فإن إدراك العوامل التنبؤية وخصائص المرض يعد قضية أساسية. الأهداف: تقييم خصائص الحالات المؤكدة مخبرياً لعدوى السارس-2 CoV في محافظة الفيوم ، مصر ، وتحديد العوامل التنبؤية لشدة المرض. الطريقة: تم جمع مائة وأربعين مريضاً تم تأكيد إصابتهم بفيروس SARS-CoV-2 من محافظة الفيوم ، مصر ، في هذه الدراسة الوصفية متعددة المراكز. كان تصنيف النوع الفرعي لـ SARS-CoV-2 وفقاً لمبادئ توجيهية منظمة الصحة العالمية (WHO) لتصنيف شدة مرض SARS-CoV-2. تم تقسيم المرضى إلى مجموعة الحالات غير المصحوبة بأعراض / غير الشديدة ومجموعة الحالات الشديدة / الحرجة. خضع كل مريض للتصوير المقطعي المحوسب للصدر (CT) ، والتقييم السريري والمختبري في شكل تعداد الدم الكامل ، ونسبة العدلات إلى الخلايا الليمفاوية (NLR) ، ونسبة الخلايا الليمفاوية إلى الخلايا الوحيدة (LMR) ، ونسبة الصفائح الدموية إلى الخلايا الليمفاوية (PLR) ، اختبارات وظائف الكبد ، اليوريا ، الكرياتينين ، بروتين C \square التفاعلي (CRP) ، مصلي الفيبريتين ، و D-dimer. النتائج: كان المرضى الحرجون / الحرجون أكبر سناً ($52,0 \pm 12,6$) مع معدل إحصائي أعلى بكثير لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسر (P < 0.001) من الحالات غير الشديدة. كان ضيق التنفس أكثر الأعراض انتشاراً بين المجموعة الشديدة / الحرجة (87,5% ، P < 0.001). ارتباط سلبي بين درجة التصوير الشعاعي ومؤشر الأوكسجين ($r = -0.302$ ، $p = 0.007$). باستخدام تحليل ROC ، كانت المنطقة الواقعة تحت المنحنى (AUC) أعلى درجات التصوير الشعاعي ، D-dimer ، CRP ، ferritin ، و NLR ، مع $p < 0.05$ في الحالات الشديدة / الحرجة. الاستنتاجات: قد يساهم ارتفاع CRP و D-dimer و ferritin في المصل ودرجة التصوير الشعاعي و NLR في الحكم على شدة SARS-CoV-2 ، ويساعد الأطباء على تقييم حالة المريض. يمكن أن تحدث العدوى المشتركة لـ SARS-CoV-2 والسل ، وقد تتطور نحو SARS-CoV-2 الشديدة.

الكلمات المفتاحية: SARS-CoV2 ، مصر ، السل ، العوامل التنبؤية الشديدة / الحرجة