

## البحث الرابع

### مسح تغذوي للأطفال دون سن الخامسة في مركز طامية بالفيوم ، مصر

#### مقدمة:

يتسبب سوء التغذية في نصف وفيات الأطفال دون الخامسة كما هو الحال في العديد من البلدان النامية. في مصر ، يظل سوء التغذية قضية مهمة حيث أن ٥.٥٪ من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من نقص الوزن المرضي ، و ٨.٤٪ يعانون من الهزال و ٢١.٤٪ يعانون من التقزم.

#### اهداف البحث:

أجريت هذه الدراسة لتقييم عوامل انتشار وسوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة الذين يسعون للحصول على المشورة الطبية في مرافق الرعاية الصحية بمركز طامية بالفيوم.

#### منهجية البحث:

شملت هذه الدراسة الوصفية المستعرضة ٤٠٠ طفل دون سن الخامسة في مركز طامية بالفيوم. وقد تم تنفيذه على مدى ٥ أشهر من يونيو إلى أكتوبر ٢٠١٤. وقد خضع جميع المرضى لاستيفاء استبيان لقياس المتغيرات الديمغرافية ، والقياسات البشرية بما في ذلك الوزن والطول ومقارنته بمعايير منظمة الصحة العالمية.

#### النتائج:

ظهرت دراستنا أن ٢٣.٢٪ ، ١٨.٥٪ و ١٩.٣٪ من الأطفال كانوا يعانون من نقص الوزن ، التقزم والهزال ، على التوالي. كان التقزم أكثر شيوعاً في الإناث من الذكور. أيضاً ، تظهر نتائجنا أن عوامل اختطار سوء التغذية كانت ٧٠.٦٪ من الإصابة الطفيلية و ١٥.٧٪ للإلتهاب المعوي مع ارتفاع معدلات الإصابة الطفيلية ، والعدوى الديدانية ، والتهاب المعدة والأمعاء بين الأطفال المهددين ، التقزم ، والأطفال ذوي الوزن القليل.

#### التوصيات:

ان معدل انتشار سوء التغذية مرتفعاً بين الأطفال دون الخامسة من العمر. تشير هذه النتائج إلى الحاجة إلى تنفيذ برنامج غذائي للتدخل في المستشفيات والمجتمع.

#### كلمات البحث:

سوء التغذية ، نقص الوزن ، الهزال ، التقزم ، الأطفال دون الخامسة