

: تقييم الوعي والممارسات المتعلقة بالحقن الآمن بين مقدمي الرعاية الصحية في الرعاية الصحية الأولية: دراسة قائمة على الملاحظة  
Assessment of safe injection awareness and practices among healthcare providers at primary health care facilities: An observational study  
Journal of the Egyptian Public Health Association –(2022) 97:29  
الأبحاث المقدمة من الدكتورة / رندة فؤاد الدسوقي – استاذ مساعد الصحة العامة - جامعة الفيوم

## البحث السادس

**النشر: . 2022**

: تقييم الوعي والممارسات المتعلقة بالحقن الآمن بين مقدمي الرعاية الصحية في الرعاية الصحية الأولية: دراسة قائمة على الملاحظة  
Assessment of safe injection awareness and practices among healthcare providers at primary health care facilities: An observational study  
Journal of the Egyptian Public Health Association –(2022) 97:29

### عنوان البحث باللغة العربية :

: تقييم الوعي والممارسات المتعلقة بالحقن الآمن بين مقدمي الرعاية الصحية في الرعاية الصحية الأولية: دراسة قائمة على الملاحظة

### المشاركين في البحث :

د. لمياء عبد الجواد علي  
أ.م. د. رندة فؤاد الدسوقي  
مدرس صحة عامة وطب المجتمع- كلية الطب - جامعة الفيوم.  
استاذ مساعد صحة عامة وطب المجتمع- كلية الطب - جامعة الفيوم.

### الملخص العربي :

الخلفية: يستلزم الحقن غير الآمن بعض الخطوات الوقائية بما في ذلك تعزيز وضمان تنفيذ إدارة الحقن الآمن وطرق التخلص من النفايات

الهدف: هدفت الدراسة إلى تقييم الوعي وممارسات الحقن الآمن بين مقدمي الرعاية الصحية العاملين في جميع مرافق الرعاية الصحية الأولية للرعاية الصحية الأولية في محافظة الفيوم ، مصر. أيضاً ، قامت بتقييم الوعي والاستعداد والاستجابة فيما يتعلق بإصابات وخز الإبر.(NSIs)

الطرق: أسفرت دراسة رصدية مقطعية أجريت في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2019 في جميع مرافق الرعاية الصحية الأولية العاملة عن تسجيل 685 من مقدمي الرعاية الصحية ، ومراقبة 520 عملية حقن. تم جمع البيانات من خلال مجموعة من مقابلات الموظفين والملاحظة المنظمة لعمليات الحقن المختلفة باستخدام أداة جيم المنقحة من قبل منظمة الصحة العالمية.

النتائج: تنفيذ سياسات وإجراءات الحقن الآمن وما بعد التعرض للمعهد الوطني للإحصاء في مرافق الرعاية الصحية الأولية (96.5%). بلغت نسبة الامتثال لغسل اليدين قبل تحضير الإجراء (56.7%) ، والتخلص الفوري من الإبر المستعملة (76.2%) في الحقن المرصودة. بلغ معدل التطعيم ضد التهاب الكبد B بين المشاركين 87.2%. تم الإبلاغ عن تطبيق نظام تقارير NSI من قبل (87.6%) من المشاركين ، فقط (38.8%) من أولئك الذين عايشوا حدث NSI تم الإبلاغ عنهم. نسبة NSI كانت (14%).

الاستنتاجات: تتمتع مرافق الرعاية الصحية الأولية بالفيوم بمستوى وعي جيد بين مقدمي الرعاية والامتثال المقبول على نطاق واسع لممارسات الحقن وفقاً لأداة منظمة الصحة العالمية. كانت معظم التدابير المرضية والمنفذة لمواجهة NSI في مكانها الصحيح. هناك حاجة لاتخاذ إجراءات مقدرة للحفاظ على الوعي العادل وتحسين الممارسات لتحسين ممارسات الحقن في مرافق الرعاية الصحية الأولية في البلدان النامية.