

نسبة مشاهدة المواد الإباحية في مرضى ضعف الإنتصاب

رسالة

توطئة للحصول علي درجة الماجستير فى طب وجراحة امراض الذكورة والتناسل

مقدمة من

الطبيب/ أحمد عبد التواب خلف الله

(بكالوريوس الطب و الجراحة)

تحت اشراف

د / إيهاب عبد اللطيف عثمان

أستاذ مساعد طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل

كلية الطب – جامعة القاهرة

د/ محمد يسري الأمير

مدرس طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل

كلية الطب – جامعة القاهرة

كلية الطب

جامعة القاهرة

2021

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة الحالية إلى تقييم مدى انتشار استخدام المواد الإباحية وتوضيح التفاعل الممكن بين استخدام المواد الإباحية و القصور الجنسي لدى الذكور ، لإظهار ما إذا كان استخدام المواد الإباحية يمكن أن يكون عامل لحدوث الخلل الجنسي الوظيفي لدى الذكور أو هو نتيجة له.

و أجريت الدراسة على مجموعة مكونة من 70 رجلاً متزوجاً (تتراوح أعمارهم بين 20 و 60 عاماً). تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: 50 مشاركاً يشكون من القصور الجنسي و 20 مشاركاً مع إنتصاب طبيعي.

و قد تم أخذ التاريخ الشخصي و المرضي الكامل و الفحص العام و الموضعي و تقييم الوظيفة الجنسية باستخدام النسخة العربية من الدليل الدولي للاختلال الوظيفي الإنتصابي المكون من 15 سؤال و استبيان الشغف بالمواد الاباحية و استبيان بيك للقلق و الاكتئاب و إجراء تحاليل هرمونات و أشعة الدوبلر الملون للمرضى فقط.

أظهرت النتائج الرئيسية للدراسة ما يلي:

- كانت نسبة الإصابة بشغف مشاهدة المواد الإباحية بين مجموعة الانتصاب الطبيعي 15% بينما بين مجموعة ضعف الانتصاب 48%.
- كان هناك (64.2%) من جميع المشاركين يستخدمون مواد إباحية و (35.8%) لا يستخدمون المواد الإباحية على الإطلاق.
- زيادة نسبة الاصابة بالقلق و العدوانية و الاعراض النفسجسمانية بين المصابين بشغف الاباحية.

أخيراً ، نوصي بأن تقدم مرافق الرعاية الصحية خدمات تعليمية وإرشادية فعالة للحياة الجنسية للأزواج مع تحذير الناس من عيوب مشاهدة المواد الإباحية.