

بطاقة تسجيل البحث الثامن

عنوان البحث : Significance and Impact of the Intersphincteric Plane :
Sepsis in the Management of the Perianal Sepsis: Ultrasound Study

- أهمية وتأثير التقيح في مستوى بين عضلتي الشرج الداخلية والخارجية في علاج التقيح حول الشرج:- دراسة بواسطة الموجات فوق الصوتية
- أسماء الباحثين وأدوارهم :

التوقيع	دور الباحث	الكلية	التخصص	الاسم
	فكرة البحث- جمع المادة العلمية- تقييم الحالات -و استخلاص النتائج - كتابة البحث و متابعة النشر	طب الفيوم	الأشعة التشخيصية	اشرف طلعت يوسف حسين

- ملحوظات : بحث منفرد محلي مقبول النشر
- مكان إجراء البحث : مستشفى الفيوم الجامعي
- مكان نشر البحث : **Journal of gastrointestinal and abdominal radiology**
- تاريخ النشر : مجلة الجهاز المعدي معوي والبطن للأشعة .مقبولة للنشر ديسمبر ٢٠٢٠ و نشرت اون لاين اولا ١٠ يناير ٢٠٢١

• **البحث الثامن:-** أهمية وتأثير التقيح في مستوى بين عضلتي الشرج الداخلية والخارجية في علاج التقيح حول الشرج:- دراسة بواسطة الموجات فوق الصوتية

ملخص البحث :-

مقدمة :-

٩٠% من التقيح حول الشرج يكون بسبب انسداد قنوات الغدد الشرجية نتيجة عدوى بكتيرية . وسائل التصوير المختلفة المستخدمة لتشخيص التقيح حول الشرج تشمل الموجات فوق الصوتية من خلال الشرج او عن طريق العجان أو التصوير بالرنين المغناطيسي .

تهدف الدراسة الى اكتشاف مختلف الأشكال من التقيح حول الشرج ونسبة حدوثها وكذلك لتوضيح أهمية المستوى بين عضلتي الشرج لتوضيح كيفية حدوث الخراج والناشير الشرجية لتحسين العلاج الجراحي

المنهجية :-

دراسة وصفية بأثر رجعي حيث تم تقييم ٥٧ مريض بالتقيح في المستوى بين عضلتي الشرج وذلك من خلال التاريخ المرض والفحص الإكلينيكي وكذلك الموجات فوق الصوتية والتشخيص النهائي تم الوصول له بدمج نتائج الموجات فوق الصوتية للفحص الشرجي.

النتائج :-

ان الدراسة الحالية أوضحت أشكال عديدة من التقيح بالمستوى بين عضلتي الشرج وكذلك نسبة حدوثها, هذه الأشكال مثل الناسور والجيوب الصديدية والخراجات والناسور مع تكوين خراج ووجود صديد حر وأشكال أخرى معقدة كخراج حدوه الحصان والخراج المصاحب لجيب صديدي أو ناسور ممتد عبر عضلة الشرج

الاستنتاج :-

إن فهم دور المستوى بين عضلتي الشرج في تكوين خراج الشرج والناسور الشرجي قد يساعد في الوصول الى أفضل طريقه للعلاج