

البحث الأول:

تأثير التدخين السلبي على إلتام أهداب الغشاء المخاطي للأنف بعد جراحة المنظار الأنفي الوظيفي للجيوب الانفية في الأطفال

بحث منشور دولي في:

J Laryngol Otol. 2009 Jan;123(1):75-9.

الملخص العربي:

يتلازم التدخين السلبي في الاطفال مع زيادة أعداد الاطفال اللذين يعانون من امراض الجهاز التنفسى. و مع ذلك لم يتم نشر اى بحث عن تأثير التدخين السلبي على إلتام أهداب الغشاء المخاطي للأنف بعد جراحة المنظار الأنفي الوظيفي للجيوب الانفية. و قد تمت هذه الدراسة على ٣٨ طفل يعانون من التهاب مزمن في الجيوب الانفية. و قد تم عمل مقارنة بين مجموعتين من الاطفال، مجموعة تتعرض للتدخين السلبي و مجموعة اخرى لا تتعرض للتدخين السلبي من حيث إلتام أهداب الغشاء المخاطي للأنف بعد عملية جراحة المنظار الأنفي الوظيفي للجيوب الانفية. تستنتج الدراسة الى أن التدخين السلبي له تأثير عكسى على إلتام أهداب الغشاء المخاطي للأنف بعد جراحة المنظار الأنفي الوظيفي.