

البحث الثانى:

إستئصال الكيس المخى الانفى بإستخدام المنظار الأنفى مع إعتبارات التخدير.
بحث منشور فى:

Int J Pediatric Otorhinolaryngol. 2010 Aug;74(8):869-73.

الملخص العربى:

يظهر الكيس المخى الانفى كزائده لحمية بالانف و يتم علاجها بالجراحة فى مراحل اولية من العمر. و هناك الكثير من الطرق الجراحية و تشمل الفتح الجانبي للانف و الجراحة المباشرة عن طريق الانف و طرق اخرى. و مع ذلك فإن العلاج عن الطريق المباشر عن طريق الانف بإستخدام المنظار الانفى يمكن ان يجنب المضاعفات التى تحدث مع الطرق الاخرى. و تهدف هذه الدراسة لتقييم فعالية هذه الطريقة و تسجيل دور طبيب التخدير أثناء الجراحة و بعدها. و قد اجريت هذه الدراسة على تسعة حالات يعانون من وجود كيس مخى بالانف. و تم تأكيد التشخيص بأستخدام الاشعة المقطعية و الرنين المغناطيسى. و تم استئصال الكيس عن الطريق المباشر عن طريق الانف بإستخدام المنظار الانفى. و تشير النتائج إلى النجاح فى إستئصال الكيس كاملا فى كل المرضى بدون أى عودة للمرض أثناء المتابعة لمدة لا تقل عن احدى و عشرون شهرا. و لم تسجل اى مضاعفات او وفيات اثناء او بعد الجراحة. و يستنتج البحث الى فعالية و نجاح هذه الطريقة مع وضوح اهمية دور طبيب التخدير أثناء الجراحة و بعدها و اثناء المتابعة ايضا.