

البحث الثاني

عنوان البحث باللغة العربية :

جراحات فتق مفصل الفك داخل القناة السمعية الخارجية. تحليل ١٣ حالة

الملخص العربي

تأكل الجدار الأمامي من القناة السمعية الخارجية نادر الحدوث في جراحات الأذن.

الهدف: اقتراح طريقة فنية لإعادة تأهيل عيوب الجدار الأمامي على أساس حجم الفتق.

الحالات والطريقة: دراسة بأثر رجعي عن ١٣ حالة بها فتق بالجدار الأمامي للأذن الخارجية بين عامي ١٩٩٨ و ٢٠١٠. والأمراض المسببة للفتق كانت ورم كوليستيرولي (لحالتين)، التهاب الأذن الخارجية المزمن (٣ حالات)، تفزر خلقي (حالة واحدة)، و ٥ حالات ظهرت بعد عملية جراحية لازالة تورم عظمي و حالتين خرق عرضي أثناء معايرة القناة السمعية. و قد قسم حجم الخلل قياسيا خلال العملية الجراحية الى "صغيرة" (> ٤ مم) و "متوسطة" (بين ٤ و ٨ ملم) و "كبيرة" (< ٨ ملم). تم تنفيذ إعادة التأهيل في ٧ حالات من خلال القناة السمعية وفي ٦ حالات تم استخدام النهج الأمامي من الجدار الأمامي للقناة السمعية.

النتائج: تراوحت فترة المتابعة ٦-٢٤ شهرا. في ١٠ حالات كانت النتيجة مرضية جدا (في ٣ حالات واجهنا بعض مضاعفات طفيفة). في الحالات الثلاث الأخرى كان هناك حالة مع التهاب مستمر من القناة السمعية الخارجية، حالة واحدة من تكرار ابتعاد الرقعة عن الغشاء الطبلي وحالة تطلبت مراجعة جراحية.

الخاتمة: نهج و طريقة الجراحة تكون وفقا لحجم الخلل، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.