

البحث السادس (بحث مشترك غير مشتق من رسالة)

عنوان البحث باللغة العربية :

الخنة كمقياس النتائج في التهاب الأنف الحركي الوعائي المرضى بعد العلاج
بالستيرويدات داخل الأنف مقابل غسيل الأنف بمحلول ملحي عالي التركيز.

الملخص العربي :

المقدمة :

التهاب الأنف الحركي الوعائي هو الشكل الأكثر شيوعاً من التهاب الأنف المزمن غير التحسسي يتم تشخيص التهاب الأنف الحركي الوعائي غياب العدوي والحساسية وفرط الحمضات والتغيرات الهرمونية .

الاهداف:

وكان الهدف من هذه الدراسة إلي تقييم كورتيكوستيرويد داخل الأنف مقابل غسيل الأنف بمحلول ملحي عالي التركيز على نتائج الخنة للمرضى الذي يعانون من التهاب الأنف الحركي الوعائي .

طريقة البحث:

أجريت الدراسة على واحد وسبعون مريض من قسم طب الأذن والالتهاب والحنجرة ، مستشفيات جامعة القاهرة - القصر العيني ، والذين يعانون من انسداد بالأنف لمدة لا تقل عن ٦ شهور وتم تشخيصهم إكلينيكياً وبواسطة المنظار انهم يعانون من التهاب الأنف الحركي والوعائي مع سلبية اختبار وخز الجلد . تعرض المرضى لتقييم nasometry للحصول على مقدار الخنة قبل العلاج للمرضى ثم تم تصنيفها بشكل عشوائي إلي مجموعتين : المجموعة (أ) والتي شملت ٣٣ مريضاً الذين تلقوا تعليمات لتطبيق موميتازون فوريت الأنف رذاذ الأنف اثنين في كل فتحة مرة واحدة يومياً لمدة ثلاثة أشهر والمجموعة (ب) والتي شملت ٣٨ مريضاً الذين تلقوا تعليمات لتطبيق محلول ملحي عالي التركيز غسول رذاذ الأنف ثلاث مرات يومياً لمدة ثلاثة أشهر .

النتائج :

المرضى من المجموعتين أعيد تقييمها من قبل nasometry لتقييم نتائج مقدار الخنة بهم بعد كل خطة العلاج .

الاستنتاج:

يبدو أن داخل الأنف الرى المالحة مفرط التوتر فعالة للغاية في علاج التهاب الأنف الحركي الوعائي أن تقترب من تأثير الكورتيزون داخل الأنف .

تم الكشف عن الحمض النووي الفطري في سائل ارتشاح الأذن الوسطى في ٢٣.٣٪ من المرضى باستخدام اختبار PCR، وتم الكشف عن فطريات في ٦.١٦٪ من المرضى على أجار Sabouraud. هناك علاقة ذات دلالة بين الكشف عن فطريات سائل الأذن الوسطى ومدة المرض ولحمية خلف الأنف، وتاريخ مرضي للربو.

