

البحث السابع (بحث مشترك غير مشتق من رسالة)

عنوان البحث باللغة العربية :

مقارنة بين تأثير الستيرويد الموضعي والستيرويد الموضعي ومعه ايتراكونازول في منع تكرار التهابات الجيوب الانفية الفطرية التحسسية لمرضى ارتفاع ضغط الدم و / مرضي السكري .

الملخص العربي : المقدمة:

التهاب الأنف والجيوب الأنفية الفطري التحسسي هو الشكل الأكثر شيوعاً من الأمراض الفطرية في الأنف والجيوب الأنفية وهو ناتج عن فرط الحساسية للفطريات . إن العلاج الرئيسي للسيطرة على هذا الإلتهاب هو حرجة تنظيف الجيوب الأنفية بالمنظار تليها الستيرويد بصورة موضعية أو عامة . على الرغم من أن الستيرويد معروف بأن له نتائج واعدة لعلاج التهاب الأنف والجيوب الأنفية الفطري التحسسي إلا أن استخدامه لفترة طويلة لا ينصح به . لذلك ، حاول بعض الباحثين استخدام العلاج المضاد للفطريات لتقليل معدل تكرار التهاب الأنف والجيوب الأنفية الفطري التحسسي .

الاهداف

مقارنة بين تأثير الستيرويد الموضعي والستيرويد الموضعي ومعه ايتراكونازول في منع تكرار التهابات الجيوب الانفية الفطرية التحسسية لمرضى ارتفاع ضغط الدم و / مرضي السكري .

طريقة البحث

في هذه الدراسة ، قارنا فعالية الستيرويد الموضعي (رذاذ أنفي) مقابل الستيرويد الموضعي ومعه ايتراكونازول في منع تكرار التهاب الجيوب الأنفية الفطرية التحسسية بعد الجراحة في المرضى المعروفين بإرتفاع ضغط الدم أو السكري . شملت الدراسة ٦٠ مريضاً يعانون من التهاب الأنف والجيوب الأنفية الفطري التحسسي . تم تقسيم المرضى عشوائياً إلي مجموعتين ، المجموعة (أ) : استخدمت الستيرويد الموضعي فقط والمجموعة (ب) : استخدمت الستيرويد الموضعي والإيتراكونازول . وتمت مقارنة النتائج في نهاية الستة أشهر .

النتائج

كان المرضى من المجموعة (ب) أفضل من حيث تحسن الأعراض والإزالة بالمنظار .

الاستنتاج

أن استخدام الستيرويد الموضعي والإيتراكونازول أفضل من استخدام الستيرويد الموضعي فقط من حيث تحسن الأعراض والإزالة بالمنظار .

