

## الملخص العربي

### نزيف الأنف الخلفى المستعصي دائماً ما يحتاج للعلاج بالتدخل الجراحي.

استخدم ربط/ كي الشريان الوتدي الحنكي باستخدام المنظار في الآونة الأخيرة بصورة واسعة لعلاج مثل هذه الحالات. وبالرغم من نجاح هذه الطريقة في علاج كثير من الحالات بدون حدوث مضاعفات تذكر إلا أنه هناك نسبة ليست بسيطة تعاني من فشل هذه الطريقة وارتداد النزيف مرة أخرى. وقد قامت هذه الرسالة على دراسة أسباب فشل ربط الشريان الوتدي الحنكي في علاج حالات نزيف الأنف وتفاديها عن طريق ربط الشريان الفكي الداخلي باستخدام المنظار عن طريق الأنف والجيب الوجني مع تقييم نتائج هذه الطريقة من حيث الكفاءة والمضاعفات.

في الفترة من مايو ٢٠٠٥ إلى يناير ٢٠١٠ تم إجراء عملية ربط للشريان الفكي الداخلي باستخدام المنظار لإحدى وأربعون مريضاً يعانون من نزيف الأنف الخلفى المستعصي وتمت المتابعة لفترة عام بعد إجراء العملية.

وأثبتت النتائج أن نسبة نجاح هذه الطريقة أعلى من ربط الشريان الوتدي الحنكي باستخدام المنظار حيث حدث ارتداد للنزيف لاثنتين فقط من المرضى وهي نسبة تقل عن ٥% مع عدم وجود مضاعفات تذكر لباقي الحالات.

ويوصي بإجراء دراسات بصورة أكبر على هذه الطريقة لتقييم أسباب ارتداد النزيف (رغم صغر النسبة) وتفاديها في المستقبل.