

## ضيق الحنجرة تحت المزمار و ضيق الجزء العلوى من القصبة الهوائية الناتج عن طول فترة إستخدام أنبوبة القصبة الهوائية

منشور فى المجلة الطبية لقصر العينى مجلد ١١، عدد ٥، ملحق سبتمبر ٢٠٠٥، ١٣٧-١٤٥  
**الملخص العربى:**

يستهدف هذا البحث تقييم عماية الاستئصال الجزئى و الوصل لضيق الحنجرة تحت المزمارى و القصبة الهوائية الناتج عن طول فترة إستخدام أنبوبة القصبة الهوائية. وقد أجرى هذا البحث على ٢٠ مريضا من مرضى ضيق الحنجرة و القصبة الهوائية حيث تعرض ١٨ مريض للاستئصال الجزئى مع التوصيل. ثلاثة منهم – بعد فشل الجراحة – تعرضوا لجراحة مراجعة مع تكوين ناسور بين القصبة الهوائية و الحنجرة مع السطح الخارجى لجلد الرقبة، بينما تعرض اثنان من المرضى لعمل جراحة الاستئصال مع تكوين ناسور كجراحة أولية. تم إزالة أنبوبة القصبة الهوائية فى ١٤ مريض، ١٠ منهم فى مجموعة الاستئصال الجراحى (٧١,٤%) مع حالة وفاة واحدة بسبب إتهاب رئوى بعد الجراحة، و نجحت الجراحة أيضا فى ٢ من مجموعة الناسور الثانوية (٣ حالات) (٦٦.٦%). كما تم إزالة أنبوبة الحنجرية أيضا فى كلا المريضين ذوى جراحة الناسور الأولية (١٠٠%)