



كلية الطب



جامعة الفيوم
Fayoum University

1. البحث الاول: بحث جماعي منشور

Two-Stage Buccal Mucosal Graft Urethroplasty

اصلاح مجري البول باستخدام الغشاء المخاطي للغم علي مرحلتين

الملخص العربي:

المقدمة

قد وصف العديد من الجراحين تقنيات تقويم الإحليل باستخدام رقعة محررة من الأنسجة، مثل الجلد والغشاء المخاطي للمثانة. الرقعة المحررة للغشاء المخاطي الشدقي من الشفة الداخلية والخدالداخلي قد استخدمت لإعادة بناء الإحليل في الحالات المعقدة. نحن نسجل تقرير تجربتنا باستخدام الرقعة المحررة للغشاء المخاطي الشدقي كجراحة أولية لحالات الإحليل البولي السفلي الخلفية في ٩ حالات

المواد والطرق

بين يناير / كانون الثاني ٢٠٠٧ ويونيو / حزيران ٢٠١١، تم علاج ٩ مرضى باستخدام الغشاء المخاطي للغم في عولية ب الإحليل

النتائج

لم تكن هناك مضاعفات تنطوي على فتحة الإحليل الجلدي أو المواقع المانحة لرقعة الغشاء المخاطي. في المرحلة الثانية كان هناك دليل على تضيق الإحليل في حالة واحدة، لم يكن هناك أي تضيق أو رتج في أي مريض. حدث ناسور بولي في حالة واحدة الاستنتاجات:

تعتبر عملية اصلاح مجري البول باستخدام الغشاء المخاطي للغم خيارا ممتازا لاستيراد الأنسجة الجيدة لعملية تقويم الإحليل.