



كلية الطب



جامعة الفيوم
Fayoum University

2. البحث الثاني: بحث جماعي منشور

Single Access Laparoscopic TrauamyoPlasty for

Hypertrophic Pyloric Stenosismas

علاج تضخم البواب الضخامي بطريقة التروموميوبلاستي بالمظار من خلال منفذ واحد

الملخص العربي:

لدراسة سلامة وجدويعلاج تضخم البواب الضخامي بطريقة التروموميوبلاستي بالمظار من خلال منفذ واحد ودراسة المضاعفات العملية التي قد تحدث باستخدام هذه التقنية.

تم اجراء دراسة مستقبلية على ٢٠ مريضا بتشخيص تضيق البواب الضخامي الطفولي. وقد خضعوا لطريقة التروموميوبلاستي بالمظار من خلال منفذ واحد في مستشفى جامعة القاهرة التخصصي للأطفال خلال الفترة من نيسان / أبريل ٢٠١٠ إلى أيار / مايو ٢٠١٢.

وكشفت الدراسة أن علاج تضخم البواب الضخامي بطريقة التروموميوبلاستي بالمظار من خلال منفذ واحد لديه نتائج تجميلية ممتازة، وأيضاً وقت ومضاعفات الجراحة مماثل للطرق الأخرى، لذلك يمكن اعتبارها تقنية بديلة لعلاج تضيق البواب الضخامي الطفولي.

الكلمات المفتاحية: تضيق البواب الضخامي الطفولي، طريقة التروموميوبلاستي.