

Post Bariatric Medial Thigh Lift: A Case Series

عنوان البحث باللغة العربية:

شد الفخذ الأنسي بعد عمليات السمنة: عرض حالة

ملخص البحث

خلفية الموضوع: بعد فقدان الوزن الهائل كثيرا ما يتطلب تنسيق قوام الفخذ وتحسين المظهر والوظيفة. يمكن أن يرتبط عمليات شد الفخذين مع مضاعفات كبيرة. نقدم سلسلة من الحالات من مرضى السمنة اللذين يخضعون لعمليات شد الفخذين باستخدام النهج الفني الذي يعالج الجلد الزائد الرأسي والأفقي.

الطرق: من يناير ٢٠١٢ إلى مايو ٢٠١٤، خضع ١٥ مريضا الى عمليات شد الفخذين بعد عمليات السمنة وتم استعراض بأثر رجعي الملاحظات على العمليات لتقييم المضاعفات التي حدثت

النتائج: لم تكن هناك مضاعفات كبيرة بعد العملية الجراحية من حيث إعادة العملية، تجمعات دموية، الجلطات ولا تجمعات للسوائل تحت الجلد. كان اثنان من المرضى، وجميعهم من المدخنين يعانون من مضاعفات التئام الجروح السطحية. النتائج الجمالية كانت مرضية لجميع المرضى بعد متابعة على مدى ٦ اشهر

المخلص: شد الفخذ الانسي هي الطريقة الأفضل لتنسيق قوام الفخذ للمرضى الذين فقدوا كم كبير من الوزن. لا توجد طريقة ثابتة للحالات كلها لكن هذه العملية هي الموصوفة للتعامل مع زيادة الجلد من الناحية الافقية و الرأسية. طريقة لوكوود (الندبة الافقية) لا تستطيع التعامل مع المشاكل التشريحية التي تنتج عن فقدان الوزن الهائل، لذلك الشق الطولى مع الشفط هو الأفضل لهؤلاء المرضى