

البحث السابع

عنوان البحث باللغة الانجليزية:

Functional and aesthetic evaluation of Abbe- Sabattini cross lip flap for reconstruction of lower lip after squamous cell carcinoma excision

عنوان البحث باللغة العربية:

التقييم الوظيفي والجمالي لسديلة أبى -ساباتيني الجلدية العابرة لإعادة بناء الشفة السفلى بعد استئصال سرطان الخلايا الحرشفية

ملخص البحث:

الخلفية: العيوب التي تشمل أكثر من نصف الشفة لا تستطيع إصلاحها بالطرق التقليدية. لذلك ، نقل الأنسجة ضروري. التقنيات الجراحية الموصى بها لهذه العيوب هي لسديلة أبى -ساباتيني و ايستلاندر الجلدية العابرة لإعادة بناء الشفة السفلى.

الطرق: عشرة مرضى ب سرطان الخلايا الحرشفية في الشفة السفلى لا تصل إلى زاوية الفم رفعه مع هامش أمان يتراوح بين ٠.٥ سم إلى ١ سم في كل جانب و الاستئصال لا يشمل زاوية الفم. حجم العيوب كانت في جميع المرضى بعد استئصال الورم تتراوح من ٢/١ إلى ٣/٢ حجم الشفة السفلى. إعادة البناء تم في جميع المرضى الذين باستخدام سديلة أبى -ساباتيني و ايستلاندر الجلدية العابرة لإعادة بناء الشفة السفلى وفصل السديلة تم بعد ثلاثة أسابيع

النتائج: كان متوسط عمر المرضى ٥٦.٥ سنة (تتراوح بين ٤٧-٧٠ سنة). كان سبعة مرضى ذكور و ثلاثة مرضى كانوا من الإناث. في جميع المرضى السديلات نجت تماما. نقيم سديلة أبى -ساباتيني و ايستلاندر الجلدية العابرة فيما يتعلق بالجوانب الوظيفية والجمالية. قدمت سديلة أبى -ساباتيني و ايستلاندر الجلدية العابرة نتيجة وظيفية جيدة فيما يتعلق بالغذاء والسوائل عن طريق الفم ، ومجرى الهواء والكلام. في سبعة مرضى كان الأحساس اكتسب تماما في غضون ستة أشهر ، ولكن في ثلاثة مرضى كانت هناك ضعف طفيف في الاحساس تحسن بعد سنة واحدة. نحن وجدت أيضا أن سديلة أبى -ساباتيني و ايستلاندر الجلدية العابرة كانت جيدة من النتيجة الجمالية.

الملخص: ان سديلة أبى -ساباتيني الجلدية العابرة هي سديلة متعدد الاستخدامات لإعادة بناء عيوب أسفل الشفاه التي تتراوح من ٢/١ إلى ٣/٢ من حجم الشفة السفلى و لا تشمل زاوية الفم مع نتائج وظيفية وجمالية جيدة جدا