

بطاقة احاطة البحث

عنوان البحث باللغة الانجليزية:

Laparoscopic gradual traction of the testicular vessels in case of impalpable undescended testes

عنوان البحث باللغة العربية: السحب التدريجي للأوعية الدموية للخصية في حالة الخصية المعلقة غير المحسوسة

International Education and Research Journal May 2016

مكان و تاريخ النشر:

اسماء المشتركين في البحث:

م	المؤلف	دوره	التخصص	التوقيع	التقييم
1	غادة مرشد أحمد	فكرة البحث و عمل العمليات و جمع البيانات وتحليل النتائج و كتابة المقال والمراجعة Corresponding author	جراحة عملة وجراحة جهاز هضمي		لم يسبق التقييم تم النشر دولي
2	احمد فارس	المشاركة في العمليات	جراحة أطفال		

المخلص باللغة العربية:

المقدمة: يوجد حوالي 20% من الأطفال يولدوا بخصية معلقة والهدف من العمل هو تقييم تقنية وصفت حديثا (طريقة الجر التدريجي) لعلاج الخصية المعلقة الغير قابلة للانسحاب بالمنظار المرضى والطرق: شملت هذه الدراسة 28 مريض مع 30 خصية غير محسوسة إلى العيادات الخارجية لمستشفى جامعة الفيوم في يوليو 2013 - يناير 2016 . تم انزال الخصيتين داخل البطن بالمنظار إذا كانت منخفضة و السحب على مراحل (شحاتة تقنية) إذا كانت عالية. تم تقييم الأطفال بعد الجراحة للتحقق من موقع وحجم الخصية واستبعاد أي مضاعفات أخرى. المتابعة كانت 6-18 شهرا . النتائج: متوسط عمر المرضى كان 8.90 سنوات بالمتابعة، كانت الخصيتين ذو حجم طبيعي و في وضع جيد في كيس الصفن في جميع حالات منخفضة الخصية وفي مجموعات السحب على مراحل مع معدل نجاح عام 100%. وانحدر أحد الخصيتين من غرزة الجر وقمنا بعمل إجراء فولر ستيفنس. الإستنتاج: بالنسبة للخصية عالية المستوى عندما يكون عملية انزالها على مرحلة واحدة صعبة، فإن السحب التدريجي(تقنية شحاتة) لديها نتائج ممتازة.