

الدرجة:

اسم الطالب : محمود محمد إسماعيل أحمد

الماجستير

عنوان الرسالة: استخدام المنظار الجراحي لتدبيس واستئصال دوالي الخصية للمقارنة باستخدام المنظار الجراحي لاستئصال دوالي الخصية في علاج دوالي الخصية: دراسة مقارنة

المشرفون: ١- ا.د / أيمن محمود فوزي عيسوي

٢- د / غادة مرشد أحمد مرشد

٣- د / هاني فايز حبشي

قسم : الجراحة العامة

تاريخ منح الدرجة من مجلس الكلية:

## ملخص الرسالة

دوالي الخصية هي تورم الشبكة الوريدية في كيس الصفن و التي تمثل الصرف الوريدي الأولي من الخصية. وهي تمثل حوالي ١٥٪ من الذكور البالغين مع غلبة في الجانب الأيسر، و يرجع السبب في أغلب الحالات الى ارتجاع تدفق الدم في الوريد المنوي واختلاف اعداد و أشكال الوريد المنوي في الناحية اليمنى واليسرى.

ان استئصال الدوالي بالمنظار قد تم اقتراحه كبديل للعملية الجراحية التقليدية لاصلاح دوالي الخصية مع وجود فوائد اكثر منها قصر فترة النقاهة ، وصغر الجروح المستخدمة ، وأقل كمية مسكن بعد الجراحة. وتعتبر الآن الأكثر شيوعا في علاج دوالي الخصيتين. الهدف من هذه الدراسة هو مقارنة النتائج بما في ذلك الوقت المستخدم، وتحليل السائل المنوي، والمضاعفات بين استخدام المنظار لعلاج دوالي الخصية مع قطع الوريد أو الأوردة بين الكليسات و بين فقط وضع الكليسات دون قطع للأوردة.

و قد اجريت هذه الدراسة على عشرين مريضا يعانون من دوالي الخصية و قد أجري لهم استئصال الدوالي عن طريق وضع الكليسات مع قطع للأوردة بالمنظار (مجموعة ١-١٠ مرضى) وعن طريق وضع الكليسات بدون قطع للأوردة بالمنظار (مجموعة ٢-١٠ مرضى) وذلك لدراسة أمان و سهولة و تأثير استئصال الدوالي بالمنظار دون قطع الأوردة. استخدام المنظار دون قطع الأوردة كان الأفضل في استئصال الدوالي من استخدام المنظار مع قطع الأوردة لعدم وجود أفضلية في النتائج من خلال قطع الأوردة مع قلة احتمالات اصابة الشريان الخصوي أو الوعاء الناقل للحيوانات المنوية عن طريق وضع الكليسات بدون قطع للأوردة بالمنظار. و قد أمكن في الطريقتين من التعرف على الشريان الخصوي و تجنب اصابته. و قد أكدت الدراسات الحديثة ان معظم حالات دوالي الخصية تكون على الناحيتين، وبالتالي تكون الفائدة أكبر اذا ما استخدمنا المنظار في علاجها. ولكن لم تكن أعداد الحالات في هذه الدراسة كافيا لايضاح الفارق بين الطريقتين المستخدمتان في علاج دوالي الخصية