

عنوان البحث/ تقييم استخدام كليسات LT400 في اغلاق جذر الزائده الدوديه بعد استئصالها بواسطة المنظار الجراحي

المشاركون في البحث / د خالد دياب- د محمود ابراهيم ابو النور- د محمد فتحي زيدان (غير مشتق من رسالة)

مكان النشر/ مجلة الجراحة المصريه يونيو 2022

مقدمه/ إن اغلاق جذر الزائده الدوديه بعد استئصالها من أهم خطوات العمليه لمنع حدوث تسريب أو التهاب بعد الجراحة بيد أن الطريقة المثلى لإغلاقها ما زال مجالاً واسعاً للبحث

وفي هذا البحث قد تم تقييم استخدام كليسات LT400 في اغلاقها من حيث الأمان والإمكانية

النتيجة / تم اجراء هذا البحث على ١٠٢ مريضاً ، منهم ٢٩ حاله شخصوا بوجود التهاب شديد ( خراج - غرغرينه أو تورم محيط بالزائده الدوديه الملتهبه بشده)

جميع المرضى تم اجراء الجراحه لهم بواسطة المنظار الجراحي إلا حاله واحده فقط تم التحول الى الفتح الجراحي بعد فشل المنظار في استئصالها

كان متوسط وقت العمليه حوالي ٢٩دقيقه فيما كان متوسط مده الإقامه في المستشفى يوماً واحداً فقط.

وكان عدد الكليسات المستخدمه في الحالات يتراوح بين ٣-٨ كليسات

١٠ حالات من المرضى المشمولين في البحث كان جذر الزائده الدوديه ملتهباً بشده ومتهكاً لذا فضلنا استخدام وسيلة اخرى للإغلاق وهي HEM-O-LOK

مضاعفات ما بعد العمليه حدثت في ٧ حالات فقط وكلهم تعرض لحدوث التهاب سطحي مكان الجرح فقط.

لا يوجد حالات عانت من حدوث تسريب من جذر الزائده الدوديه ولا يوجد أي حالات استدعت إعادة الحجز والدخول للمستشفى

الاستنتاج / وجدنا بعد اتمام هذه الدراسه أن استخدام كليسات LT400 لإغلاق جذر الزائده الدوديه طريقة آمنه ومتاحة وسهله الاستخدام وغير مكلفة ولا يحتاج وضعها لخبرات متراكمه مقارنةً بالطرق الأخرى الموصوفه لإغلاق جذر الزائده الدوديه بالمنظار