

التحديات الجراحية لاستئصال المرارة بالمنظار فى الكبد المتليف

أيمن عيسوى، نادر شعبان زكى، صلاح سعيد سليمان

المقدمة: ان التهاب المرارة المتكرر مع وجود حصوات فى مرضى تليف الكبد تعتبر مشكلة شائعة لهؤلاء المرضى. ويعتبر وجود تليف بالكبد من الأسباب التى تؤدى إلى استبعاد استخدام المنظار الجراحى فى استئصال المرارة، مع تقدم الوقت وزيادة الخبرات فى استخدام المنظار الجراحى أصبح استئصال المرارة فى مرضى تليف الكبد وراى استخدامه مع اعطاء نتائج أحسن للمريض، وفى هذا البحث سنقوم بعرض أهمية استخدامه والنتائج المترتبة على ذلك. تم عمل هذه الدراسة بمستشفى جامعة الفيوم على عدد ٥٠ مريض يعانون من تليف فى الكبد مثبت بالفحوصات والتحليل، تم استبعاد من هم أو ما يطلق عليهم تشيلد، وتم العمل على مجموعة التشيلد أ ، ب وتم استخدام المنظار لاستئصال المرارة مع أخذ عينة من الكبد للتأكد من التليف وتحديد نوعه وحساب الوقت المستخدم فى العملية وكمية النزيف والصعوبات التى واجهتنا أثناء استئصال المرارة، وكذلك المضاعفات التى عانى منها المرضى بعد العملية ونسب تحويل العملية من المنظار الى الجراحة التقليدية.

وقد أثبتت النتائج أن استخدام المنظار الجراحى فى مرضى تليف الكبد أ، ب هو الأمل لهم من الجراحة التقليدية من حيث المضاعفات بعد الجراحة وفترة جلوس المريض بالمستشفى.

مكان وتاريخ النشر: مجلة القصر العينى للجراحة، المجلد ١٤، عدد ٣، سبتمبر ٢٠١٣