

الملخص

الشرخ الشرجي هو مرض شائع الحدوث، يمكن تشخيصه باستخدام التاريخ المرضي وكذلك الفحص الطبي. يفضل أن يكون العلاج المبكر علاج تحفظي غير جراحي، ذلك لأن معظم الحالات تلتئم بواسطة تدخل بسيط. توافر الخيارات الطبية لعلاج حالات الشرخ المزمن، ولكن لم يثبت أن أي منها أفضل من العلاج الجراحي.

قطع العضلة العاصرة الداخلية للشرج هو العلاج الفعال لحالات الشرخ، ولكن التئام الشرخ بنسبة تصل إلى ٨٠٪ من الحالات عن طريق العلاج الموضعي بواسطة الجلسرين ثلاثي النيترات، أدى إلى الاعتقاد بأن هذه العملية الجراحية قد تصبح بلا قيمة.

الدراسة تحاول تقييم نتائج العلاج الموضعي بواسطة الجلسرين ثلاثي النيترات ٢٪ لمدة ٨ أسابيع لحالات الشرخ المزمن بالعيادة الخارجية ومقارنتها بنتائج العلاج الجراحي.

الجلسرين ثلاثي النيترات أدى إلى التئام ١٠ من ٢٠ مريض تلقوا العلاج بعد ٨ أسابيع من العلاج، و التئام ١٤ بعد ١٣ أسبوع من العلاج.

تم قطع العضلة العاصرة الداخلية للشرج في ٢٠ مريض آخرين، وبعد متابعة لمدة ٨ أسابيع وجد أن الشرخ قد التئم في ٩٠٪ من المرضى وفي ١٠٪ بعد ١٠ أسابيع من الجراحة، ولم يحدث مضاعفات جسيمة بعد الجراحة. في هذه الدراسة العلاج الموضعي بواسطة الجلسرين ثلاثي النيترات لحالات الشرخ المزمن بالعيادة الخارجية كان أقل فاعلية من نتائج الدراسات الإكلينيكية. قطع العضلة العاصرة الداخلية للشرج جراحيًا لا يزال علاج جيد خاص للحالات التي لا تستجيب للعلاج الموضعي بواسطة الجلسرين ثلاثي النيترات.