

البحث الثالث

عنوان البحث:

خصائص المرضى ونتائج الام والجنين بين حالات المشيمه المنزاحه والنزيف العرضى

ملخص البحث:

المقدمه:

نزيف الثلث الثالث هو أحد الاسباب الرئيسيه لحالات الطوارئء التوليديه، والتي تساهم بشكل كبير فى صحة الام ومرضى ووفيات الاجنه .

يتم تعريفه على أنه نزيف من أو الى الجهاز التناسلى قبل ولاده أى طفل فى أى وقت من الاسبوع ال ٢٠ من وقت الحمل فى بعض البلدان المتقدمه أو فى ٢٤ أسبوعا من عمر الحمل فى دول أخرى أو ٢٨ أسبوعا فى البلدان ذات أوضاع الموارد المنخفضه تفتقر بالتالى الى ما يكفى من حضانات لدعم حديثى الولاده .

الهدف من هذه الدراسه :

هدفت الدراسه الى توضيح النتائج مع الامراض المرتبطه بها ، والتي سوف تساعد فى تحديد حجم المشكله التى يشكلها النزيف فى ما قبل الولاده من أجل تحسين تدابير الاداره المتاحه لمعالجه هذه الحالات والتخفيف من حدتها على الفور .

المرضى والطرق:

هذه الدراسه عباره عن دراسه قائمه على الملاحظه أجريت فى فى قسم أمراض النساء والتوليد ،كلية الطب ،مستشفى جامعه الفيوم ومستشفى جامعه الساحل التعليمى . يتم ادخال جميع حالات النزف قبل الولاده الى وحده الطوارئء بمستشفى الولاده بعد عمر ٢٨ أسبوعا من الحمل خلال فتره الحمل من (١ أغسطس ٢٠١٩ الى نهايه نوفمبر ٢٠٢٠) تم تضمينها فى هذه الدراسه ، وأستيفاء معايير التضمن والاستبعاد .

النتائج :

أجمالى عدد المرضى الذين تم أستقبالهم فى قسم التوليد مع نزيف APH ما قبل الولاده خلال فتره الدراسه ١٢٠ حاله منهم ٢٥ حاله أختياريه وجميعهم كانت حالات أنزياح مشيمه وكانت ٩٥ حاله طارنه .٦٧ حاله(٥٥.٨٣%) من المشيمه المنزاحه (٢٥ أختياريه و ٤٢ طارنه)

و ٤٤ (٣٦.٦٣٦%) نزيف عرضى (كلها حالات طارنه أو مستعجله) ، ٩ (٧.٥%) لاسباب أخرى . تشمل نتائج الامهات فى PPP أعداد متزايدة

فى ٦٧ حاله CS (١٠٠%) ، زياده عدد وحدات الدم ووحدته نقل الدم (١-١٨) بمتوسط ٣.٣١±٣.٢٧ ، أستئصال الرحم فى ٢١ حاله(٣١.٣%) ، صدمه ١٩ حاله (٤٣.٣%) ،أصابه المسالك البولييه أو أصابه المثانه أو الحالب ٥ حالات (٧.٥%) ، حالات أصابه فى

المثانه وحاله واهدده أصابه فى الحالب كل منهم كانت المشيمه منزاحه ، دخول وحده العنايه المركزه ١٤ حاله (٢٠.٩%) ، حدث نزيف ما بعد الولاده فى ٦ حالات والام وفيات واحده (١.٥%) . فى حين أن خروج الامهات فى حالات النزف العرضى كان هناك عدد من حالات الولاده القيصرية كانت ٣٥ حاله و ٩ حالات تم تسليمها عن طريق المهبل ، عدد وحدات نقل الدم (١-

١٨) الوحده بمتوسط ٣.٥٧±٣.٠٨

أستئصال الرحم ٣ حالات (٦.٨%) ، الصدمه ٢٢ حاله (٥٠%)

الاستنتاج :

الاستنتاج السابق أن CS هو الاكثر عامل خطر مهم لانخفاض المشيمه وتسمم الحمل التراكمى والانقطاع السابق لهما من أهم عوامل الخطوره

أنفصال المرضات الجينييه المرتبطه كلا من المشيمه المنزاحه والانفصال هما الخداج ، وأنخفاض الوزن عند الولاده ، وأنخفاض درجه أبغار

. NICU ، القبول فى