

البحث السابع

عنوان البحث:

عامل أنتشار وخطوره ألتصاقات ما بعد الجراحه بعد ولاده قبصريه متكرره :دراسه جماعيه مستقبليه

ملخص البحث:

الهدف:

تقييم أنتشار ألتصاقات داخل فى الولادات القيصريه المتكرره وعوامل الخطر الشخصيه والجراحيه المرتبطه بها .

الطريقه:

أجريت هذه الدراسه الاترابيه المرتقبه فى جناح الولاده بمستشفى جامعه الفيوم من أكتوبر ٢٠٢٠ الى ديسمبر ٢٠٢١ . تم تجنيد النساء وفقا لمعايير الادراج والاستبعاد المحدده مسبقا . كانت النساء المؤهلات تمت مقابلتهم ، وتم الحصول على البيانات من التاريخ الشخصى ،والجراحه السابقه والتاريخ التوليدى ،وبيانات حول الولاده الحاليه . تم أستخدام نظام تسجيل ناير لتقييم ألتصاقات داخل الصفاق . كانت البيانات والمضاعفات بعد الجراحه .

النتائج:

تم تجنيد ٣٠٠ أمراه ألتصاقات معتدله الى شديده حدثت فى ٦٢% . كان هولاى المرضى يقضون فترات طويله فى المستشفى وكانوا كذلك يقدمها جراحون خبراء (الاحتمال >٠.٠٠١ ، و >٠.٠٠٨ على التوالى) . التصاق نقاط مرتبطه بشكل أيجابى مع عمر المريض (الاحتمال >٠.٠٠١) التكافؤ (الاحتمال >٠.٠٠١) ، فتره الحمل (الاحتمال =٠.٠٣٣) ، مده دخول المستشفى سواء سابقا أو فى التسليم الحالى (الاحتمال >٠.٠٠١ و >٠.٠٠١) وقت التمشي (الاحتمال >٠.٠٠١) ،وقت الحركه المعويه (الاحتمال >٠.٠٠١) ،وقت العمليه (الاحتمال >٠.٠٠١) ، عمر الجراحين وخبرتهم (الاحتمال لكل منهما >٠.٠١) .

الاستنتاج:

الالتصاقات تودى الى زياده مرضه الامهات . مساهمات متعدده كانت العوامل مرتبطه بشكل كبير بالالتصاقات مع الولادات القيصريه المتعدده.