

مقارنة بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية في حالات تسمم الحمل في مستشفى الرعاية الثالثية في مصر

مقدمة

تسمم الحمل هو ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل من مسببات غير معروفة. هو يسبب تأخر النمو داخل الرحم ، الولادة قبل النضج ، وفاة الجنين داخل الرحم ، المشيمة المباعدة. كما يتسبب في زيادة معدلات مضاعفات الحمل والوفيات بين النساء الحوامل. سبب تسمم الحمل غير معروف ، يبدو أن هناك بعض العوامل المسببة . العوامل التي تشمل مرض السكري ، والسمنة ، والحمل المتعدد ، والحمل لأول مرة، والعمر ، التاريخ المرضي ، وارتفاع ضغط الدم المزمن

أساليب الدراسة

دراسة استرجاعية بمستشفى جامعة أسوان في الفترة من ١ يناير ٢٠١٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣. تم تشخيص المرض عن طريق (ضغط الدم الانقباضي ١٦٠ أو أكثر و / أو ضغط الدم الانبساطي ١١٠ أو أكثر في مناسبتين أربع ساعات على حدة في وضع شبه الإعداد بالإضافة إلى مجموعة البروتين ٢٤ ساعة في البول ٥ غرام أو أكثر).

النتائج:

هناك ١٥٢ عملية قيصرية بنسبة حدوث (٦٤.٩٥٪) و ٨٢ حالة ولادة طبيعية مع نسبة حدوث ٣٥.٠٤٪. كان تسمم الحمل أكثر شيوعا في الفئة العمرية ٢١-٣٠ سنة عددهم ٩٩ حالة مع نسبة حدوث (٤٢.٣٪) وأقل شيوعا في الفئة العمرية < ٣٧ سنة ٢٣ حالة مع نسبة حدوث (٩.٨٢٪ الخداج ٣٥ حالة في الولادة القيصرية مع حدوث (٢٣.٠٢٪) مقابل ١٦ حالة في ولادة طبيعية مع حدوث (١٩.٥١٪) حالات نزيف عرضي ٢ في الولادة القيصرية مع نسبة وقوع (١.٣١٪) مقابل ٢ الحالات في الولادة الطبيعية مع حدوث (٢.٤٣٪) ، الفشل الكلوي الحاد ٢ الحالات في الولادة الطبيعية مع نسبة حدوث (٢.٤٣٪)

الاستنتاجات

يزيد تسمم الحمل من حدوث معدل الولادة القيصرية وذلك للوقاية من مضاعفات الأمهات إنهاء الحمل عن طريق الولادة القيصرية يقلل من مضاعفات الأمهات الحوامل و يحسن نتائج الأمهات عن طريق الحد من المضاعفات