

البحث الاول

عنوان البحث باللغة العربية:

نتائج الحمل فى حالات تمزق الاغشيه قبل الولاده بمستشفى أسوان الجامعى

ملخص البحث:

الخلفيه:

تمزق الاغشيه قبل الاوان هو أحد مضاعفات الحمل فى هذه الحاله ،ينكسر الكيس(الغشاء الامينوسى) المحيط بالطفل (بتمزق) بل الاسبوع ٣٧ من الحمل .بمجرد أن ينكسر الكيس، سيكون هناك خطر متزايد للاصابه بالعدوى . ستكون هناك أيضا فرصه أكبر للولاده المبكره .

الهدف:

كان الهدف من العمل هو تحديد نتائج الام والجنين من قبل تمزق الاغشيه قبل الولاده فى مستشفى جامعه أسوان .

المرضى والطرق:

تضمنت هذه الدراسه الوصفيه الرصديه ١٠٠ أمراه مع تمزق الاغشيه قبل الاوان ، ويحضرون فى قسم النساء والولاده ،مستشفى جامعه أسوان.

أجريت هذه الدراسه فى الفتره من أكتوبر ٢٠١٧ الى أكتوبر ٢٠١٨ .

النتائج:

لوحظت النتائج الجنينيه على النحو التالى . كان متوسط البقاء فى وحده العنايه المركزه لحديثى الولاده هو متوسط 8.3 ± 0.67 بينما كان الخداج هو المضاعفات الوليديه الاكثر شيوعا بنسبه ١٦% ثم بنسبه ٥٢% بينما كان أجمالى وفيات الاطفال حديثى الولاده ٨% لم يكن ٤٥% من الولدان بحاجة للبقاء فى وحده العنايه المركزه بينما كان الحد الاقصى للاقامه بالعنايه المركزه ٤٠ يوما بنسبه ٢% .أظهرت الارتباطات بين فتره الكمون والنتائج الجنينيه أن فتره الكمون الاقصر أقل من أسبوعين تزيد من أنتشار الولاده المبكره وتزيد من أنتشار الولاده المبكره بينما تزيد فتره الكمون الاطول < أسبوعين من أنتشار الاتان الوليدى و البقاء فى وحده العنايه المركزه ، فى حين أن وفيات الفتره المحيطه بالولاده متساويه تقريبا فى كلا المجموعتين .

الاستنتاج

تأثرات أمراض ووفيات الفتره المحيطه بالولاده أيضا بتفضيل الحفظ حيث وجدت هذه الدراسه ارتفاعا فى حدوث أمراض الفتره المحيطه بالولاده

مثل الخداج بنسبه ٥٣% ثم الولاده المبكره ٥٢% ثم الاتان الوليدى بنسبه ١٦%