

دراسة مقارنة بين دور دواء دوبيسيالات الكالسيوم ودواء الكيموتربسين فى علاج اكياس المبايض الوظيفية

أطروحة تمهيدية مقدمة من

الطبيبة /شيماء محمد عثمان

بكالوريوس الطب والجراحة

توطئة للحصول على درجة الماجستير فى النساء والتوليد

تحت اشراف

ا.د/عبد السميع عبد المنعم عبد السميع

استاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الفيوم

د/المنذوه حسين بصيلة

مدرس النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الفيوم

د/ايمان محمد مجاهد

مدرس النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الفيوم

المخلص

تعتبر أكياس المبايض الوظيفية النوع الأكثر شيوعاً بين أكياس المبايض لدى النساء في سن الإنجاب ، والتي غالباً ما تكون بدون أعراض وقد تختفي في غضون ثلاثة أشهر دون الحاجة لتدخل علاجي أو جراحي ، ويعد اختيار العلاج المناسب لأكياس المبايض الوظيفية من أكثر المشكلات التي تواجه أطباء أمراض النساء اليوم على الرغم من توفر طرق العلاج المختلفة.

الهدف من الدراسة هو المقارنة بين دوبيسيالات الكالسيوم من خلال عمله كمضاد لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية و الألفينترن من خلال تأثيره المضاد للالتهابات في علاج أكياس المبايض الوظيفية.

وقد اشتملت الدراسة على مائة امرأة غير حامل تتراوح أعمارهن ما بين الثمانية عشر عاماً وحتى خمس وأربعين عاماً يعانين من أكياس مبايض وظيفية ، واللاتي لم يتلقين علاج سابق لأكياس المبايض الوظيفية ، وتم تقسيم المرضى إلى مجموعتين متساويتين ، كل مجموعة تضمنت خمسين امرأة على النحو التالي: تضمنت المجموعة الأولى النساء اللواتي تم إعطاؤهن دوبيسيالات الكالسيوم والمجموعة الثانية تضمنت النساء اللواتي تم إعطاؤهن ألفينترن، وحضر المرضى للعيادة الخارجية بعد نهاية الدورة الشهرية لمدة ثلاثة أشهر للمتابعة بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل.

وقد استنتجت الرسالة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين دوبيسيالات الكالسيوم وألفينترن فيما يتعلق بالمتابعة وذلك بعد (شهر و شهرين و ثلاثة أشهر) ولكنها كشفت عن فروق ذات دلالة إحصائية عالية بين المتابعات بعد (شهر و شهرين و ثلاثة أشهر) وذلك فيما يتعلق بمجموعة دوبيسيالات الكالسيوم ، حيث كان هناك فرق ذات دلالة إحصائية في المتابعة بعد شهر واحد عند مقارنتها بالمتابعة بعد (شهرين و ثلاثة أشهر) ، كما كشفت عن فرق ذو دلالة إحصائية عالية بين المتابعات بعد (شهر و شهرين و ثلاثة أشهر) فيما يتعلق بمجموعة ألفينترن.

ووجدت فروق ذات دلالة إحصائية عالية بين درجة السمنة (عادية ، وزن زائد ، سمنة) فيما يتعلق بالمتابعة بعد شهر واحد في مجموعة دوبيسيالات الكالسيوم ، بينما لا يوجد فرق ذات دلالة إحصائية بين درجة السمنة (عادية ، زيادة الوزن ، سمنة) فيما يتعلق بالمتابعة بعد شهرين و ثلاثة أشهر ، كما لم يكن هناك فرق ذو دلالة إحصائية بين درجة السمنة (عادية ، زيادة الوزن ، والسمنة) فيما يتعلق بالمتابعة بعد (شهر و شهرين و ثلاثة أشهر) في مجموعة ألفينترن.

وتوصي الدراسة بزيادة جرعة دوبيسيلات الكالسيوم في المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة ، علاوة على ذلك ، يعد ألفينترن أكثر كفاءة في تحسين كيس المبيض الوظيفي في المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.