

البحث الثالث

النتائج المبكرة التابعة لخياطة
الغشاء البريتوني أثناء الولادة
القيصرية للمرة الأولى

**EARLY POSTOPERATIVE
OUTCOMES OF
PERITONEAL CLOSURE AT
FIRST CESAREAN SECTION**



Fayoum University

Faculty of Medicine بطاقة إحاطة لإجراء بحث

Obstetrics Gynecology Dept

السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية

تحية طيبة وبعد ،،

نحيط سيادتكم علما بأننا سنقوم بأجراء البحث الآتي: النتائج المبكرة التابعة لخيطة الغشاء البريتوني أثناء الولادة القيصرية للمرة الأولى

EARLY POSTOPERATIVE OUTCOMES OF PERITONEAL CLOSURE AT FIRST CESERAN SECTION

المشاركون في البحث:

- | | |
|---|------------------------------------|
| قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب- جامعة الأزهر- فرع أسيوط | ١- محمود السحمي محمد |
| قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب-جامعة الأزهر -القاهرة | ٢-مفيد فوزى |
| قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب- جامعة الفيوم | ٣- عبد السميع عبد المنعم عبدالسميع |
| قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب-جامعة الأزهر -القاهرة | ٤- احمد طة |

مقدمة لسيادتكم

د- عبدالسميع عبد المنعم عبدالسميع

استاذ مساعد امراض النساء والتوليد

عميد الكلية

أ.د خالد الخشاب



جامعة الفيوم

كلية الطب

Fayoum University

Faculty of Medicine

Obstetrics Gynecology Dept.

بيان لدور الباحث :

البحث الثالث : بحث مشترك فى التخصص غير مشتق من رسالة علمية .

عنوان البحث: النتائج المبكرة التابعة لخيطة الغشاء البريتوني أثناء الولادة القيصرية للمرة الأولى

EARLY POSTOPERATIVE OUTCOMES OF PERITONEAL CLOSURE AT FIRST CESAREAN SECTION.

الاسم	دور الباحث	التوقيع
١- د- محمود السحمي محمد	كتابة البحث - اجراء العمليات -عمل التحاليل	
٢- د- مفيد فوزي	فكرة البحث - اجراء الفحوص الطبية- استخلاص النتائج	
٣- د- عبد السميع عبد المنعم عبد السميع	فكرة البحث - اجراء العمليات - - استخلاص النتائج	
٤- احمد طة	فكرة البحث - اختيار السيدات - اجراء الفحوص الطبية- استخلاص النتائج	

مكان وتاريخ النشر:

**AL -AZHAR ASSUIT MEDICAL JOURNAL
,VOL.10,N0.3,APRIL,2012,suppl 1.**

عميد الكلية

أ.د خالد الخشاب

البحث الثالث

النتائج المبكرة التابعة لخيطة الغشاء البريتوني أثناء الولادة القيصرية للمرة الأولى

EARLY POSTOPERATIVE OUTCOMES OF PERITONEAL CLOSURE AT FIRST CESAREAN SECTION.

د- عبد السميع عبد المنعم عبد السميع

ملخص البحث. خياطة الغشاء البريتوني في جراحات البطن السفلى تم النصح بها في التعليم الجراحي التقليدي. وذلك لاستعادة الأوضاع

والعلاقات التشريحية الطبيعية قبل إجراء الجراحة و أيضا لمنع حدوث التصاقات بين الأمعاء و أغشية البطن الداخلية أو بين الرحم و أغشية البطن الداخلية ولإستعادة الحاجز البريتوني للخفض من مخاطر العدوى و للخفض من فرص حدوث فتق و للخفض من مخاطر تباعد طبقات البطن و مع ذلك فان فوائد هذه الطريقة لم تتمكن الدراسة من إثباتها.

الدراسة الحالية أجريت لمقارنة إغلاق مقابل عدم إغلاق الغشاء البريتوني الجداري و الحشوي أثناء الولادة القيصرية بما يتعلق بالنتائج قصيرة المدى بعد العملية .

و قد كان عدد المشاركات في الدراسة ١٠٠ سيدة يخضعن لولادة قيصرية أولى و تم تصنيفهن الى مجموعتين ،المجموعة ١ و تتكون من ٥٠ سيدة اخضعن لولادة قيصرية مع عدم خياطة الغشاء البريتوني،

و المجموعة ٢ و تتكون من ٥٠ سيدة اخضعن لولادة قيصرية مع خياطة الغشاء البريتوني . تم حساب عدد الحالات المشاركة عن طريق اختبارات إحصائية و تم دراسة النتائج و مقارنتها إحصائيا للحصول على نتائج فعالة.

فيما يتعلق بالنتائج ، لقد وجدنا أن عدم خياطة الغشاء البريتوني الحشوي و الجداري يقلل من زمن العملية بمعدل ٥.١ دقيقة و يقلل من احتياج المسكنات كما تمت استعادة حركة الأمعاء أسرع من المجموعة التي تم فيها خياطة طبقتي الغشاء البريتوني .

عدم خياطة طبقتي الغشاء البريتوني أثناء الولادة القيصرية الاولى كان مصحوبا بتحسن في النتائج المبكرة للعملية ، و لكن قد نحتاج الى دراسات اخرى لفحص النتائج على المدى الطويل في حالة خياطة الغشاء البريتوني من عدمه أثناء الولادة القيصرية ، و لتقييم مدى خطورة حدوث التصاق و ذلك إما عن طريق إلقاء نظرة ثانية بمنظار البطن أو بتقييم درجة الالتصاق خلال الولادة القيصرية التالية.

تقرير اللجنة العلمية الدائمة عن الأبحاث المقدمة من الدكتور / عبدالسميع عبدالمنعم عبدالسميع المتقدم لوظيفة
استاذ امراض النساء والتوليد - كلية الطب- جامعة الفيوم

البحث الثالث

طبيعة البحث: بحث مشترك في التخصص غير مشتق من رسالة علمية .

عنوان البحث: النتائج المبكرة التابعة لخيطة الغشاء البريتوني أثناء الولادة القيصرية للمرة الأولى

EARLY POSTOPERATIVE OUTCOMES OF PERITONEAL CLOSURE AT FIRST CESAREAN SECTION.

المشاركون في البحث:

- ١- محمود السحمي محمد قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب- جامعة الأزهر- فرع أسيوط
- ٢- مفيد فوزي قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب- جامعة الأزهر - القاهرة
- ٣- عبد السميع عبد المنعم عبدا لسميع قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب- جامعة الفيوم
- ٤- احمد طة قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب- جامعة الأزهر - القاهرة

مكان إجراء البحث: مستشفيات جامعة الأزهر.

تاريخ بداية البحث: ابريل ٢٠١١

مكان وتاريخ النشر:

AL -AZHAR ASSUIT MEDICAL JOURNAL
,VOL.10,N0.3,APRIL,2012,suppl 1.

لقد وجدنا أن عدم خيطة الغشاء البريتوني الحشوي و الجداري يقلل من زمن العملية بمعدل ٥.١ دقيقة و يقلل من احتياج المسكنات كما تمت استعادة حركة الأمعاء أسرع من المجموعة التي تم فيها خيطة طبقتي الغشاء البريتوني .

عدم خيطة طبقتي الغشاء البريتوني أثناء الولادة القيصرية الاولى كان مصحوبا بتحسن في النتائج المبكرة للعملية ،و لكن قد نحتاج الى دراسات اخرى لفحص النتائج على المدى الطويل في حالة خيطة الغشاء البريتوني من عدمه أثناء الولادة القيصرية ،و لتقييم مدى خطورة حدوث التصاق و ذلك إما عن طريق إلقاء نظرة ثانية بمنظار البطن أو بتقييم درجة الالتصاق خلال الولادة القيصرية التالية

قرار اللجنة: