

البحث الثاني

عملية الشريط المهبل غير التوتري مقارنة بعملية تعليق
المهبل لعالج حالات السلس البولي

**TVT-O VERSUS BURCH
COLPOSUSPENSION IN
TREATMENT OF STRESS
URINARY INCONTINENCE**



Fayoum University

Faculty of Medicine بطاقة إحاطة لإجراء بحث

Obstetrics Gynecology Dept

السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية

تحية طيبة وبعد ،،

نحيط سيادتكم علما بأننا سنقوم بأجراء البحث الآتي: عملية الشريط المهبل غير التوتري مقارنة بعملية تعليق المهبل لعلاج حالات السلس البولي:

TVT-O VERSUS BURCH COLPOSUSPENSION IN TREATMENT OF STRESS URINARY Incontinence.

المشاركون في البحث:

- ١- محمود السحيمي محمد قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب- جامعة الأزهر- فرع أسيوط
- ٢- إبراهيم أبو المجد عبد المتجلى قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب-جامعة الأزهر -القاهرة
- ٣- عبد السميع عبد المنعم عبدالسميع قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب- جامعة الفيوم
- ٤- سمير عبد الله على قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب-جامعة الأزهر -القاهرة

مقدمة لسيادتكم

د- عبدالسميع عبد المنعم عبدالسميع

استاذ مساعد امراض النساء والتوليد

عميد الكلية

أ.د خالد الخشاب



جامعة الفيوم

كلية الطب

Fayoum University

Faculty of Medicine

Obstetrics Gynecology Dept.

بيان لدور الباحث :

البحث الثاني: بحث مشترك غير مشتق من رسالة علمية .

عنوان البحث: عملية الشريط المهبل غير التوتري مقارنة بعملية تعليق المهبل لعلاج حالات السلس البولي .

TVT-O VERSUS BURCH COLPOSUSPENSION IN TREATMENT OF STRESS URINARY Incontinence.

د- عبد السميع عبد المنعم عبد السميع: فكرة البحث – الفحص الطبي واختيار حالات البحث المشاركة في إجراء العمليات – فحص النتائج وكتابتها ومراجعتها.

مكان وتاريخ النشر:

AL -AZHAR ASSUIT MEDICAL JOURNAL ,VOL.8,N0.2,APRIL,2010,suppl.

عميد الكلية

أ د : خالد الخشاب

البحث الثاني

عملية الشريط المهبل غير التوتري مقارنة بعملية تعليق المهبل لعلاج حالات السلس البولي .

د- عبد السميع عبدالمنعم عبدالسميع

ملخص البحث

يعد السلس البولي لدى السيدات من أكثر المشاكل شيوعا فى مجال أمراض النساء حيث تصاب به من ٤٠-٥٠% من السيدات وتختلف تلك النسبة باختلاف العمر . وقد قام الجراحون باختبار أكثر من مائتى عملية جراحية أشهرها جراحة تعليق المهبل والتي قام بها Burch عام ١٩٦١ ، وكذلك ظهرت مؤخرا عمليات الشريط المهبل غير التوتري بأنواعها . وكان الغرض من هذه الدراسة مقارنة عملية الشريط المهبل غير التوتري TVTO بعملية تعليق المهبل عن طريق البطن (COLPOSUSPENSION BURCH) من حيث نسبة النجاح والتكلفة ومدة الإقامة بالمستشفى والمضاعفات بعد العملية وكذلك الاجراء الجراحى من حيث اليسر والصعوبة . وقد تم إجراء الدراسة بمستشفيات جامعة الأزهر على ثمانين مريضة من المصابات بالسلس البولى الحقيقي، وقد تم أخذ تاريخ مرضي كامل وفحص طبي عام وموضعي وكذا عمل تحليل ومزرعة بول ودراسة لديناميكية التبول . وقد تم تقسيم المريضات الى مجموعتين كل منها أربعون سيدة كالاتى : الأولى : تم علاجهن باستخدام الشريط المهبل غير التوتري عبر القناة الدوارة TVTO الثانية : تم علاجهن باستخدام عملية تعليق المهبل عن طريق البطن (BURCH) (COLPOSUSPENSION) وكانت نسبة النجاح فى عملية الشريط المهبل غير التوتري ٩٠% وهى نفس نسبة النجاح فى عمليات تعليق المهبل عن طريق البطن . ومن حيث مدة الإقامة بالمستشفى كان متوسط الإقامة فى عملية الشريط المهبل غير التوتري حوالى ٣٦ ساعة وفى عملية تعليق المهبل عن طريق البطن كان المتوسط ٤ أيام . وأخيرا، يبقى السعر العالى جدا للشريط المستخدم فى عملية الشريط المهبل غير التوتري عبر القناة الدوارة عائق كبير أمام تعميم استخدام هذا النوع من العمليات فى البلدان النامية.

البحث الثاني

طبيعة البحث: بحث مشترك في التخصص غير مشتق من رسالة علمية .

عنوان البحث: عملية الشريط المهبل غير التوتري مقارنة بعملية تعليق المهبل لعلاج حالات السلس
البولي .

TVT-O VERSUS BURCH COLPOSUSPENSION IN TREATMENT OF STRESS URINARY Incontinence.

المشاركون في البحث:

- ١- محمود السحمي محمد قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب- جامعة الأزهر- فرع أسيوط
- ٢- إبراهيم أبو المجد عبد المتجلي قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب-جامعة الأزهر -القاهرة
- ٣- عبد السميع عبد المنعم عبدالسميع قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب- جامعة الفيوم
- ٤- سمير عبد الله على قسم أمراض النساء والتوليد، كلية الطب-جامعة الأزهر -القاهرة

مكان اجراء البحث: مستشفيات جامعة الأزهر.

تاريخ بداية البحث: مارس ٢٠٠٨ .

مكان وتاريخ نشر البحث: AL –AZHAR ASSUIT MEDICAL JOURNAL, VOL.8, NO.2, APRIL, 2010, suppl.

الهدف من البحث: ظهرت مؤخرا عمليات الشريط المهبل غير التوتري بأنواعها . وكان الغرض من هذه الدراسة مقارنة عملية الشريط المهبل غير التوتري TVTO بعملية تعليق المهبل عن طريق البطن (COLPOSUSPENSION BURCH) من حيث نسبة النجاح والتكلفة ومدة الإقامة بالمستشفى والمضاعفات بعد العملية وكذلك الاجراء الجراحي من حيث اليسر والصعوبة.

فائدة البحث ونتائج: تم إجراء الدراسة بمستشفيات جامعة الأزهر على ثمانين مريضة من المصابات بالسلس البولي الحقيقي، وقد تم أخذ تاريخ مرضي كامل وفحص طبي عام وموضعي وكذا عمل تحليل ومزرعة بول ودراسة لديناميكية التبول . وقد تم تقسيم المريضات الى مجموعتين كل منها أربعون سيدة كالاتي : الأولى : تم علاجهن باستخدام الشريط المهبل غير التوتري عبر القناة الدوارة TVTO الثانية : تم علاجهن باستخدام عملية تعليق المهبل عن طريق البطن (BURCH COLPOSUSPENSION) وكانت نسبة النجاح في عملية الشريط المهبل غير التوتري ٩٠% وهى نفس نسبة النجاح في عمليات تعليق المهبل عن طريق البطن . ومن حيث مدة الإقامة بالمستشفى كان متوسط الإقامة في عملية الشريط المهبل غير التوتري حوالى ٣٦ ساعة وفي عملية تعليق المهبل عن طريق البطن كان المتوسط ٤ أيام.

قرار اللجنة:

