

مدي استئصال عظم فرط التنسج في حالات الورم السحائي المحذب ليحقق هوامش حره مرضيا

د. حسين فتح الله

قسم جراحة المخ والأعصاب جامعة القاهرة

د. محمد جابر

قسم جراحة المخ والأعصاب جامعة الفيوم

د. احمد الفقي

قسم جراحة المخ والأعصاب جامعة القاهرة

فرط التنسج في حالات الورم السحائي المحذب يوجد في نسبة من ٤,٥ الي ٤٤% من الحالات. الإستئصال التام يجب أن يشمل ازالة كل العظم المصاب. ليس من الواضح الي أي مدي من العظم يتم استئصاله ليحقق هوامش حره مرضيا خاصة انه يوجد في أفلام الرنين علامات مضيئه بعد عظم فرط التنسج. في هذا البحث نحاول أن نضع مقياس لمدي انتشار خلايا الورم خار مركز عظم فرط التنسج وهذا يساعد في وضع أطر عامه لإستئصال العظم خار مركز عظم فرط التنسج. يحتوي البحث علي ١٤ حالة ورم سحائي محذب مع عظم فرط التنسج في الفتره من مارس ٢٠١٧ الي اغسطس ٢٠١٨ في جامعة الفيوم و جامعة القاهرة.