

عنوان البحث باللغة العربية:

اصلاح انحراف الأهداب التراكمي بالجفن السفلي للعين باستخدام عملية اعادة تموضع الطبقة للجفن في مقابل عملية الطرس.

الملخص العربي:

الغرض من البحث:

مقارنة طريقتين لاصلاح انحراف الأهداب التراكمي بالجفن السفلي للعين وهما عملية اعادة تموضع الطبقة للجفن في مقابل عملية الطرس.

الطريقة:

شملت هذه الدراسة ٦٠ مريضاً يعانون من داء انحراف الأهداب التراكمي؛ مقسمين الى مجموعتين؛ خضعت المجموعة الأولى لعملية اعادة تموضع الطبقة الامامية للجفن و خضعت المجموعة الثانية لعملية شق الطرس وشملت مقارنة النتيجة عودة انحراف الأهداب التراكمي والتحسن الجمالي. وكان متوسط فترة المتابعة ٦ أشهر.

النتائج:

حقق المرضى نتائج تجميلية جيدة في كلتا المجموعتين. متوسط عودة انحراف الأهداب التراكمي لدى مجموعة عملية اعادة تموضع الطبقة الامامية للجفن كان اقل من معدل عودة انحراف الأهداب التراكمي لدى مجموعة شق الطرس.

الاستنتاج:

اثبتت الدراسة ان عملية اعادة تموضع الطبقة الامامية أكثر فاعلية في اصلاح انحراف الأهداب التراكمي وان النتائج التجميلية لجميع المرضى جيدة أو مقبولة بالمقارنة مع مجموعة عملية شق الطرس.