

سديلة مزدوجة من العضلة الرافعة للجفن والعضلة الجبهية لاصلاح ارتخاء الجفن الخلقى الشديد المرتجع.

الملخص العربي

ارتخاء الجفن الخلقى الشديد المرتجع يشكل تحديا كبيرا لجراح الجفون في ظل وجود ندرة من الأبحاث في هذا المجال. وقد شملت بعض الطرق الموصوفة اعادة عملية تعليق الجفن بالعضلة الجبهية باستخدام مادة مختلفة أو مراجعة العملية السابقة أو استخدام سديلة العضلة الجبهية. في كل هذه التقنيات يتم تجاوز العضلة الرافعة للجفن. الهدف من هذه الدراسة هو تقييم نتائج استخدام سدلية مزدوجة من العضلة الجبهية والعضلة الرافعة الجفنية لعلاج ارتخاء الجفن الخلقى الشديد المرتجع. وقد شملت هذه الدراسة المرجعية ٣١ مريضا أجري لهم تلك العملية في اقتره مابين ٢٠١٧ و ٢٠٢٠. وقد أشارت النتائج الي تحسن ملحوظ في ارتفاع الجفن العلوي في نهاية فترة المتابعة مع تحسن تدريجي لانغلاق الجفن عند النوم. وقد حصل ٩١.٤% من الجفون علي تقييم ممتاز فيما يخص كفاف الجفن زاوية الرموش تناسق ثنية الجفن. وقد تم مراجعة العملية لجفن واحد عاني من ارتجاع الارتخاء. وقد خلص الباحثون الي ان تقنية السديلة المزدوجة تشكل علاجا آمنا وفعالاً لعلاج حالات ارتخاء الجفن الشديد المرتجع.