

السمات الأكلينيكية والأشعاعية للأورام الغير الدمعية في منطقة الكيس الدمعي.

الملخص العربي

هناك العديد من الأورام التي تظهر في منطقة الكيس الدمعي ، والتي تشبه قيلة الكيس الدمعي مما قد يؤدي الي خطأ في التشخيص ومن ثم العلاج. تهدف هذه الدراسة المرجعية المقترنة ابراز السمات الاكلينيكية والاشعاعية المميزة لتلك الاورام مقارنة بقيلة الكيس الدمعي. شملت هذه الدراسة ٨٣ مريضا (٣٩ مريضا في مجموعة الاورام غير الدمعية و ٤٤ مريضا في مجموعة قيلة الكيس الدمعي). وقد اشتملت معايير التقييم علي التاريخ المرض وفحص كامل للورم والجهاز الدمعي وأيضا السمات الاشعاعية لكل مجموعة. وقد أشارت النتائج الي مقلة الكيس الدمعي منتشرة أكثر بين السيدات ومصحوبة بزيادة في الافرازات والتدميع مقارنة بالمجموعة المقابلة. في حين امتدت الاورام الغير دمعية خارج حدود منطقة الكيس الدمعي كما ظهر ذلك في تصوير الأشعة المقطعية وكذلك كانت مصحوبة بتغيرات في الملتحمة ، وتغير وضعية مقلة العين بشكل أكبر مقارنة بالمجموعة الأخرى. وفي النهاية هناك العديد من الأورام الغير دمعية والتي تشبه في صورتها الاكلينيكية مقلة الكيس الدمعي ، والتي تحتاج الي مراجعة التاريخ المرضي بدقة وعمل فحص كامل للجهاز الدمعي والمنطقة المحيطة وعدم التردد في طلب الشعاع التشخيصية المناسبة عند وجود شك في التشخيص.