

تقييم الاربيوم ياج ليزر كمساعد في استئصال الاستئصال العميق في الزرق زاوية مفتوحة الأولية

تقييم الاربيوم ياج ليزر كمساعد على استئصال رفر ف صلب عميق كبديل لاستئصال صلب بعملية جراحية وأيضاً لتقييم دور مزروع طبي في الحفاظ على مساحة إزالة الضغط مائي تم تقسيم ثلاثين عيون المرضى الذين يعانون من الزرق زاوية مفتوحة الأولية إلى مجموعتين مجموعة ١ عيون خضعت لعملية استئصال عميق دون مزروع طبي مجموعة ٢ العينين خضع استئصال عميق مع زرع مزروع طبي كلا المجموعتين اتبعت لمدة ٦ أشهر

النتائج كان متوسط الضغط داخل العين قبل الجراحة في المجموعة ١ ٢٦,١ انخفض إلى متوسط ٧,٩ في اليوم الأول بعد المنطوق و ١٢,٤ في ٦ أشهر ، في المجموعة ٢ متوسط الضغط داخل العين كان ٢٧ انخفض إلى متوسط ٦,٢ في اليوم الأول بعد المنطوق وإلى متوسط ١٢,٢ في ٦ أشهر

استخدام الاربيوم ياج ليزر كمساعد على استئصال رفر ف صلب عميق اثبت انه بديل امن للجراحة