

دراسة باثولوجية وإحصائية لأورام المبيض السرطانية

رسالة مقدمة توطئة للحصول على درجة الماجستير فى الباثولوجيا
مقدمة من

الطبيب/ محمد محمود عبدالله على
بكالوريوس الطب والجراحة - جامعة القاهرة

تحت اشراف

أ.د/ أحمد محمد يحيى الحناوى
أستاذ الباثولوجيا - كلية الطب - جامعة القاهرة

أ.د/ جينا أسعد أسعد نخلة
أستاذ الباثولوجيا - كلية الطب - جامعة القاهرة

د/ أمل أحمد هريدى
مدرس الباثولوجيا - كلية الطب - جامعة القاهرة

كلية الطب
جامعة القاهرة
٢٠٠٩

الملخص العربي

تتسبب أورام المبيض الخبيثة في أعلى نسب لوفيات النساء من بين سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي، كما تعتبر الأصعب من ناحية التشخيص و الكشف المبكر.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية تحتل هذه الأورام المركز الخامس بالنسبة لوفيات النساء الناجمة عن السرطان (١٣٠٠٠ حالة/عام). وبالنسبة لمعظم الحالات المسجلة وجد أن معظم الحالات تكتشف في المرحلتين الثالثة و الرابعة (٦٠-٧٠%) من الحالات، مما يضاؤل من فرص العلاج و الشفاء.

الهدف من البحث هو تقديم دراسة باثولوجية و احصائية لأورام المبيض السرطانية التي تم تشخيصها فى قسم الباثولوجى بكلية طب قصر العينى خلال خمس سنوات تبدأ من يناير ٢٠٠٤ وتنتهى بنهاية ديسمبر ٢٠٠٨.

وقد تم تجميع ومراجعة ٦٠ حالة، من السجلات المتاحة بقسم الباثولوجي طب قصر العينى فى الفترة الزمنية ما بين يناير ٢٠٠٤ وحتى ديسمبر ٢٠٠٨ . ولقد تم تجميع الحقائق الإكلينيكية مثل الأعراض المرضية ، العمر، وجهة الاصابة، وكذلك الخصائص الباثولوجية الأخرى المرئية بالعين المجردة والميكروسكوبية.

لقد تم تصنيف حالات أورام المبيض السرطانية المدروسة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية لعام ٢٠٠٣ إلى ٣٢ حالة كأورام سرطانية ظهارية سطحية (٥٣،٣%)، ١٦ حالة كأورام الحبل الجنسى_السدوية (٢٦،٧%)، ٧ حالات كأورام الخلايا الجرثومية (١١،٧%)، حالتين تتكونان من خليط من أورام الحبل الجنسى_السدوية وأورام الخلايا الجرثومية (٣،٣%)، حالة واحدة من الأورام الغير نمطية (١،٧%) و حالتين كأورام ثانوية (٣،٣%).

معظم الحالات التى تم تشخيصها كانت أورام سرطانية ظهارية سطحية وكان المتوسط العمرى للتشخيص هو ٤٣،٥ سنة، حيث تراوحت أعمار الحالات بين ١١ و ٧٤ سنة. وفيما يتعلق بجانب الورم، فقد كان هناك ٤٤ حالة (٧٣،٣%) على جانب واحد، و ١٦ حالة (٢٦،٧%) على الجانبين.

اما بالنسبة لمرحلة الورم، فقد وجد ٢٣ حالة فى المرحلة الأولى (٣٨،٣%)، ١٣ حالة فى المرحلة الثانية (٢١،٧%)، ٢٣ حالة فى المرحلة الثالثة (٣٨،٣%) ، و حالة واحدة فقط فى المرحلة الرابعة (١،٧%).

فيما يتعلق بحالة الغدد الليمفاوية، فإن األبية الحالات وهم ٤٥ حالة (٧٥%) قد كانوا سلبيين للإصابة، أما ١٥ حالة فقط (٢٥%) أظهروا نتائج إيجابية للإصابة.

وقد اوضحت النتائج ان العلاقات فى المقارنة بين النوع النسيجى والدرجة ، مرحلة الورم، جانب الورم و حالة الغدد الليمفاوية جاءت غير ذات قيمة احصائية واضحة. وهذا قد يرجع الى قلة عدد الحالات المدروسة، وبالتالي فمن المقترح اجراء مزيد من الأبحاث على نطاق أوسع للحصول على سجل إحصائى قومى.