

إدراك الأمهات لعلاج الإسهال في الأطفال على المستوى المنزلي في مصر

لايزال الوقاية من الإسهال في الأطفال واحداً من أكبر المشاكل الصحية في الدول النامية. و يعتبر فهم التأثير المجمل للعوامل المتعلقة بالأمهات والتي تؤثر على الإسهال قد يعطي معلومات عن استراتيجية علاج الإسهال ومنع حدوثه و بالتالي التقليل من المرض والوفاة المتعلقة به. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى وعي أمهات الأطفال الذين هم أقل من سن خمسة سنوات عن الإسهال وعلاجه في المنزل.

منهجية الدراسة: تم عمل استبيان في الفترة من أبريل ٢٠١١ حتى نوفمبر ٢٠١١ لتجميع معلومات عن إدراك وممارسات ٦٥٠ أم مصرية بخصوص علاج الإسهال ومصادر التغذية. أظهرت الدراسة أن ٧٥.٩% من الأمهات التي تم إجراء مقابلة معهن لديهن فهم صحيح لمعنى الإسهال.

٧٣% من الأمهات لديهن فهم ضعيف لأسباب الإسهال، أكثر من ٦٠% لديهن إدراك ضعيف بخصوص محلول معالجة الجفاف ولا يستخدمونه لعلاج الإسهال، في ٢٢.٥% تم علاج الاطفال بالمضادات الحيوية و ٧١.١% من الأمهات المرضعات استمرين في إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية أثناء حدوث الإسهال.

نستخلص من هذه الدراسة أن مستوى إدراك الأمهات المتعلق بعلاج الإسهال في المنزل ومحلول معالجة الجفاف منخفض في محافظة الفيوم بمصر.

و لذلك لابد من اتخاذ جهود جادة لجعل الأمهات أكثر وعياً بأسباب الإسهال، وعلاجه واستخدام محلول معالجة الجفاف.

تعليم الأمهات بهذه الأمور الخاصة برعاية الطفل من الممكن أن يكون له اثر عالي الكفاءة يتعلق
بالتكلفة المادية كوسيلة لتحسين صحة ال