

(بحث مشترك مقبول للنشر غير مشتق من رسالة علمية)

عنوان البحث :

وصف البخاخات الموسعة للشعب الرئوية هل هناك اختلاف بين أطباء الأمراض الصدرية والأطباء الآخرين؟
Prescription of inhalers among Pulmonologists & non-Pulmonologists, is there a difference ?

المشاركون في البحث :

د.محمد طه عبد الفتاح* - د.علي عمر عبد العزيز* - د.محمد عمر عبدالعزيز** - د.محمد إبراهيم عطا*** -

د.سمير منير عبد الكريم**** - د. سيد علي أمين*****

قسم الأمراض الصدرية- جامعة المنيا* -قسم الباطنة العامة-جامعة المنيا ** -

قسم الباطنة العامة- جامعة بني سويف*** -قسم طب الأطفال-جامعة المنيا **** -

قسم طب الأطفال-جامعة الفيوم*****

مكان وتاريخ النشر : مقبول للنشر في المجلة المصرية للأمراض الصدرية

الملخص العربي :

يعد مرض الربو الشعبي ومرض الانسداد الرئوي المزمن من الأمراض الشائعة حول العالم والتي قد تؤدي إلى الوفاة ويحتاج علاج هذين المرضين إلى إعطاء المريض العلاج بصورة منتظمة عن طريق الإستنشاق بالفم. وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم وصفة طبية وتقييم المعرفة والممارسة من الأطباء الذين يمكن التعامل مع الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن المرضى، فيما يتعلق باستخدام أدوية موسعات الشعب الهوائية عن طريق الإستنشاق وكذلك تقنيات الاستنشاق. وهذه الدراسة هي دراسة مسحية مقطعية أجريت على الأطباء من مختلف التخصصات الذين يمكنهم التعامل مع الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن المرضى في محافظتي الفيوم والمنيا بجمهورية مصر العربية.

وقد أكمل الإستبيان ٤٤٣ طبيباً ممن شملتهم الدراسة. وقال ٩٠% من غير المتخصصين في أمراض الرئة أنهم كثيراً ما يتعاملون ويعالجون المرضى الذين يعانون من الأمراض الرئوية المزمنة. وأفاد ٢٥% من الأطباء أنهم لم يقوموا بوصف أدوية الاستنشاق مطلقاً. ويرجع السبب في قلة أو عدم وصفهم لأدوية الإستنشاق إلى أن ٤٢% من المرضى رفضوا استخدام أجهزة الاستنشاق. وكانت نسبة المشاركين في الإستبيان كالتالي: أطباء الأطفال ٣٧.٣%، وأطباء الأمراض الباطنية ٣٣.٧%، وأطباء الرعاية الصحية الأولية ١٦.٠%، وأمراض الرئة ١٢.٩%. وقد ذكر ٥٢% من الأطباء المشاركين أنهم يقومون بأنفسهم بتوفير التدريب اللازم للمرضى لكيفية استخدام جهاز الاستنشاق. ويفضل ٦٤.٨% من الأطباء أجهزة الاستنشاق المضغوطة بالجرعات المقننة (pMDIs). ولم تتجاوز نسبة الأطباء الذين لديهم معرفة جيدة عن العلاج بالأدوية المستنشقة ٢١.٣% (score > 2). وقد كان أخصائيو أمراض الجهاز التنفسي لديهم معرفة جيدة أعلى من المجموعات المتخصصة الأخرى بنسبة ٦٦.٧%، في حين أن أطباء الأطفال كانوا أقل نسبة ٨.٣%. ويستخلص من الدراسة أن الوصفة الطبية والمعرفة بين الأطباء بشأن العلاج بالإستنشاق وكذلك الاستخدام الصحيح لأجهزة الاستنشاق تتراوح بين أطباء أمراض الرئة وأطباء التخصصات الأخرى غير كافية بشكل عام. وهناك حاجة إلى مزيد من الجهد لتغيير موقف الأطباء نحو مفهوم العلاج بالاستنشاق

التقييم :

اسم الفاحص: أ.د./

%

الدرجة :

التوقيع :

التقدير :

