

البحث الرابع

(بحث مشترك – منشور محليا - مشتق من رسالة علمية- سبق تحكيمه)

عنوان البحث باللغة العربية :

المسح التغذوي للأطفال دون سن الخامسة بمنطقة طامية بالفيوم ، مصر.

المشاركون :

| م | أسماء الباحثين | التخصص/الوظيفة |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | د. أسماء يونس الساري | أستاذ مساعد طب المجتمع والصحة العامة -جامعة الفيوم |
| 2 | د. أحمد محود عبد المقتدر | أستاذ طب الأطفال-جامعة الفيوم |
| 3 | د. القاسم أحمد الجميل | أستاذ طب الأطفال-جامعة الفيوم |
| 4 | <u>د. وائل سيد محمد السيد بدر</u> | <u>مدرس طب الأطفال-جامعة الفيوم</u> |
| 5 | د. محمد مسعود سعيد | مدرس طب المجتمع والصحة العامة -جامعة الفيوم |
| 6 | نجلاء جمال عبد الحليم | أخصائي أطفال بوزارة الصحة |

تاريخ و مكان النشر

International Journal of Community Medicine and Public Health, 4(6), 1813 – 1818

June (2017)

ISSN: 2394-6040(online), 2394-6032(print)

doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20172138

الملخص العربي

الخلفية: سوء التغذية متورط في نصف وفيات الأطفال دون سن الخامسة كما هو الحال في العديد من البلدان النامية. في مصر ، لا يزال سوء التغذية يمثل مشكلة مهمة حيث يعاني 5.5% من الأطفال دون سن الخامسة من نقص الوزن و 8.4% يعانون من الهزال و 21.4% يعانون من التقزم. أجريت الدراسة الحالية لتقييم انتشار وعوامل الخطر لسوء التغذية بين الأطفال المرضى دون سن الخامسة الذين يسعون للحصول على المشورة الطبية في مرافق الرعاية الصحية بمنطقة طامية بالفيوم.

المنهج: شملت هذه الدراسة المقطعية الوصفية 400 طفل دون سن الخامسة في مديرية طامية بالفيوم. تم إجراؤه على مدى 5 أشهر من يونيو إلى أكتوبر 2014. خضع جميع المرضى لما يلي: أخذ التاريخ ، والقياسات البشرية بما في ذلك الوزن والطول / الطول.

النتائج: أظهرت دراستنا أن 23.2% و 18.5% و 19.3% من الأطفال يعانون من نقص الوزن والتقزم والهزال على التوالي. كان التقزم أكثر شيوعاً عند الإناث منه عند الذكور. كشفت نتائجنا أيضاً أن عوامل الخطر لسوء التغذية كانت 70.6% إصابة طفيلية و 15.7% لالتهاب المعدة والأمعاء مع انتشار مرتفع إحصائياً للإصابة الطفيلية والديدان الطفيلية والتهاب المعدة والأمعاء بقيمة $p < 0.05$ بين الأطفال الذين يعانون من الهزال والتقزم ونقص الوزن.

الاستنتاجات: كان انتشار سوء التغذية مرتفعاً بين الأطفال المرضى دون سن الخامسة. تشير هذه النتائج إلى الحاجة إلى تنفيذ برنامج التغذية التدخل القائم على المستشفى والمجتمع.

التقييم

اسم الفاحص: أ.د. /

التوقيع:

الدرجة %

التقدير: