

معدل الإصابة بالطفيليات المعوية بين الاطفال المترددون على العيادات الخارجية لكلية طب الفيوم

هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم حدوث الطفيليات المعوية بين الأطفال الذين يترددون على العيادة الخارجية لكلية طب جامعة الفيوم فى مدينة الفيوم وايضا معرفة العلاقة بينها وبين بعض العوامل الاجتماعية و البيئية والمناخية. شملت الدراسة الاطفال ما بين سن ٦ اشهر و ١٢ سنة حيث تضمنت ٧٥٠ طفل يترددون على العيادة الخارجية لكلية طب الفيوم فى مدينة الفيوم. وقد أجريت هذه الدراسة المقطعية خلال الفترة من يونيو ٢٠٠٩ الى يونيو ٢٠١٠ ، كما خضعت الدراسة لعمل استبيان بحثى بالإضافة ال جمع عينات البراز. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن معدل الإصابة بالطفيليات المعوية قد بلغ ٨٪ و ٦٨٪ حيث شكل طفيل الانتاميبا أعلى نسبة انتشار بين الطفيليات المعوية المكتشفة وصلت إلى ١٠ و ٣٤ ٪. كما كانت نسبة الإصابة بالانتروبيبسي ١,١ ٪ وايضا كانت نسبة الإصابة بالجيارديا ٣, ١٠ ٪. وقد وجدت الدراسة أن الأطفال الذكور و الفئات العمرية اكثر من سننتين كما ان الاطفال ذو المستويات المعيشية الاقل أكثر إصابة بالطفيليات المعوية. وحيث ان الطفيليات المعوية تمثل مشكلة صحية ذو حجم مجتمعى واسع كما انها تعتبر من اهم اسباب التردد على العيادات الخارجية للاطفال. أوصت الدراسة بتحسين الوضع الصحي بين هؤلاء الأطفال فالفيوم وذلك عن طريق تطبيق الدراسات الوقائية والعلاجية المؤثرة على مستوى المجتمع وايضا على مستوى المستشفيات.