

معدل انتشار الرضاعة الطبيعية المطلقة فى الستة أشهر الأولى فى منطقة ريفية مصرية

هدفت الدراسة إلى معرفة معدل انتشار الرضاعة الطبيعية المطلقة فى الستة أشهر الأولى ومعرفة العوامل التى تتدخل فى ذلك .

قد تم عمل دراسة مقطعية تضمنت ١٠٥٩ أماً تحضر إلى الوحدة الريفية لقرية الدير - محافظة القليوبية بمصر وذلك لتطعيم أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم من ٦ أشهر حتى سنتين من العمر .
وجد أن ٩٥.٨% من الأمهات ترضع أبنائهن رضاعة طبيعية ولكن فقط ٩.٧% من الأمهات ترضع أبنائهن رضاعة طبيعية مطلقة فى الستة أشهر الأولى .

وقد تبين أن متابعة الحمل (٤ زيارات أو أكثر) والبداية المبكرة للرضاعة والأطفال الذكور وعدم وجود صعوبات فى الرضاعة الطبيعية بعد الولادة هى العوامل المحددة المصاحبة لفرص أكبر لرضاعة طبيعية مطلقة فى الستة أشهر الأولى من العمر .

وقد استخلص من البحث أن معدل انتشار الرضاعة الطبيعية فى الستة أشهر الأولى منخفض فى مصر ولا بد من التدخل لعبور الفجوة بين الممارسات الحالية وتوصيات منظمة الصحة العالمية .