

الأعراض النفسية الناتجة عن الاستخدام المزمن للكورتيزول في المتلازمة الكلوية في الأطفال

يعد مرض المتلازمة الكلوية من أكثر أمراض الكلى شيوعاً في الأطفال وتعرف المتلازمة بأنها حالة إكلينيكية وتتصف بالظواهر الآتية:

أ- زيادة البروتين في البول.

ب- هبوط بنسبة زلال الدم.

ج- "أديما" تورم عام.

د- زيادة بنسبة الدهون بالدم.

وبالتالي التشخيص و العلاج والمتابعة لهم نفس القدر من الأهمية.

تتابع دراستنا عينة من المرضى الذين يترددوا علينا بعيادة الكلى بالمستشفى الجامعي

ببني سويف. هذه الدراسة تضمنت ٦٠ طفلاً منهم ٣٠ طفلاً يعانون من مرض

المتلازمة الكلوية و ٣٠ طفلاً آخرين بدون مرض

في الدراسة التي تم عملها كانت المجموعة الأولى بها (٨٠%) ذكورا و(٢٠%) إناث، وفي

المجموعة الثانية (٣ و٤٣%) ذكورا و(٧ و٥٦%) إناث

عمر الأطفال في الدراسة المشار إليها كانت تتراوح من ٦ سنوات الى ١٨ سنة وكان

متوسط عمر المجموعة الأولى ٦ و٩ سنة وبلغ متوسط أعمار المجموعة الثانية ٥ و٩

سنة .

وفي هذه الدراسة أيضا تم ملاحظة ظهور أعراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق

والعنف في الأطفال الذين تناولوا الكورتيزول لفترات طويلة مقارنة بالأطفال الذين لم

يتناولوا الكورتيزول.

في النهاية هذه النتائج تدل على حدوث أعراض نفسية كالاكتئاب والعنف والقلق في

الأطفال الذين تناولوا الكورتيزول لفترات طويلة ومختلفة.

لذلك يجب عمل اختبارات نفسية بصورة منتظمة لمرضى المتلازمة الكلوية الذين

يتناولوا الكورتيزول لفترات طويلة ، تتضمن اختبارات للاكتئاب والقلق والعنف.