

فاعلية وأمان الأدوية المستخدمة حالياً في علاج المرضى
المصابون بالالتهاب الكبد المزمن (ج) مع وجود تليف كبدي
متكافئ ولم يسبق لهم تلقي علاج

توطئة للاستكمال الجزئي لدرجة الدكتوراة في طب الامراض المتوطنة

بواسطة

طبيب/سيد احمد معوض سعد
ماجستير الامراض المتوطنة
تحت اشراف

أ.د/جمال الدين عصمت
أستاذ الأمراض المتوطنة
كلية الطب
جامعة القاهرة

د/أحمد علي جمعة
أستاذ مساعد الأمراض المتوطنة
كلية الطب
جامعة الفيوم

د/عصام علي حسن
مدرس الأمراض المتوطنة
كلية الطب
جامعة الفيوم

كلية الطب - جامعة الفيوم

2018

اسم الباحث : سيد احمد معوض سعد

الدرجة : الدكتوراة

التخصص: الامراض المتوطنة

عنوان الرسالة: فاعلية وأمان الأدوية المستخدمة حاليا في علاج المرضى المصابون بالتهاب الكبد المزمن (ج) مع وجود تليف كبدي متكافئ ولم يسبق لهم تلقي علاج

المشرفون

أ.د/جمال الدين عصمت

ا.م/أحمد علي جعة

د/ عصام علي حسن

ملخص الرسالة

يعتبر التهاب الكبد الوبائي (سي) السبب الرئيسي للوفاة من أمراض الكبد ويستهدف البحث معرفة مدى فاعلية وامن الادوية المستخدمة حاليا في علاج المرضى المصابون بالتهاب الكبد المزمن (ج) مع وجود تليف كبدي متكافئ ولم يسبق لهم تلقي علاج. أجريت هذه الدراسة على (300) مصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي المزمن (ج) الذين حضروا مستشفى الفيوم العام، الذين تلقوا العلاج، من يناير 2015 إلى يونيو 2016. توزعوا على أربع مجموعات من نظم العلاج كل مجموعة تضم 75 مريضا، المجموعة (1) تلقوا "سوفوسبوفير و ريبافيرين"، المجموعة (2) تلقوا "سوفوسبوفير و ريبافيرين و إنتيرفيرون"، المجموعة (3) تلقوا "سوفوسبوفير و سيمبريفير" ومجموعة (4) تلقوا "سوفوسبوفير و ريبافيرين و داكلاتاسفير". وقد خضع جميع المرضى للتقييم السريري، والتحقيقات المخبرية، ومتابعة ال(PCR) بعد 12 أسبوع من نهاية العلاج للكشف عن استجابة العلاج. فقط 3 مرضى لم يكملوا متابعة الجدول الزمني (من المجموعة الأولى، مريضان قبي دموي توفيا قبل متابعة نتيجة ال(PCR) وكذلك مريض واحد لم يكمل علاجه لسبب غير معروف ولاحظت دراستنا حدوث بعض الآثار السلبية خلال فترة العلاج التي كانت خفيفة إلى معتدلة ولم تؤثر على اكمال العلاج (كفقر الدم، التعب، الحساسية للضوء، فقدان الوزن، نقص الصفائح الدموية، الحكة، الصداع)، وفقا للاستجابة للعلاج (تحقيق الاستجابة الفيروسيه حيث سالبيه ال(PCR) بعد 12 اسبوع من نهاية العلاج)، في المجموعة 1 المرضى الذين تحققت لهم الاستجابة الفيروسيه 53 (70.7%)، توفي 2 (2.6%) وغاب اثناء العلاج 1 (1.3%) وانتكس 19 (25.3%)، في المجموعة الثانية من المرضى الذين تحققت لهم الاستجابة الفيروسيه 63 (84%) وانتكس 12 (16%)، في مجموعة 3 مرضى الذين تحققت لهم الاستجابة الفيروسيه 69 (92%) وانتكس 6 (8%)، في المجموعة 4 مرضى الذين تحققت لهم الاستجابة الفيروسيه 68 (90.7%) وانتكست 7 (9.3%) وقد كشفت نتائجنا أن مضادات الفيروسات المباشرة آمنة

وفعالة في علاج المرضى المصابين بفيروس التهاب الكبد الوبائي المزمن (ج) مع وجود تليف الكبد المتكافئ حيث أفضل النتائج في المجموعتين الثالثة والرابعة