

دراسة المقطع العرضي لنتائج المنظار في المرضى الذي خضعوا لمنظار الجهاز الهضمي
العلوي بمستشفى الفيوم الجامعي

دراسة

مقدمة لتوطنة درجة الماجستير في طب الامراض لتوطنة

بواسطة

شروق محمد السيد امين

طبيب مقيم امراض المتوطنة بمستشفى جامعة الفيوم

تحت اشراف

ا.د/احمد علي جمعه

استاذ طب الامراض المتوطنة

كلية الطب –جامعة الفيوم

ا.د.م/عصام على حسن

استاذ مساعد طب الامراض المتوطنة

كلية الطب –جامعة الفيوم

ا.د.م/اسماء يونس الساري

استاذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمع

كلية الطب – جامعة الفيوم

جامعة الفيوم

2020

الملخص العربي

تعتبر أعراض الجهاز الهضمي العلوي أكثر الشكاوى شيوعاً بين المرضى ، والتي يطلبون المشورة الطبية بشأنها. الأمراض المرتبطة بهذه الأعراض هي أسباب مهمة للمراضة والوفيات في جميع أنحاء العالم. أعراض الجهاز الهضمي العلوي الشائعة التي نقوم بإجراء التنظير لها هي عسر الهضم وعسر البلع والنزيف المعدي المعوي وفقدان الوزن التدريجي غير المقصود والقيء المستمر لسبب غير معروف وفقر الدم والكتلة فوق معدية.

تنظير الجهاز الهضمي هو أحد إجراءات التنظير الداخلي الأكثر شيوعاً ويوفر معلومات مفيدة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي. إنه يعطي عائداً تشخيصياً أفضل على الأشعة وخاصة في التحقيق في نزيف الجهاز الهضمي العلوي ، والحالات الالتهابية لمسار الجهاز الهضمي العلوي مثل التهاب المريء والتهاب المعدة والتهاب الاثني عشر وكذلك تشخيص تمزق مالوري فايس وتشوهات الأوعية الدموية تم العثور على منظار الجهاز الهضمي العلوي على أنه إجراء فعال وآمن نسبياً يمكن إجراؤه في المراكز الطبية الكبيرة أو المستشفيات الريفية الصغيرة أو العيادات الخارجية أو حتى المكاتب الخاصة. يؤدي تحديد أسباب أمراض الجهاز الهضمي العلوي إلى علاج أكثر كفاءة وبالتالي تقليل معدلات المراضة والوفيات.

تهدف هذه الدراسة إلى توثيق الخصائص الديموغرافية ، والمؤشرات ، ونتائج التنظير الداخلي للمرضى الذين يخضعون لمنظار الجهاز الهضمي العلوي بمستشفى جامعة الفيوم.

هذه الدراسة عبارة عن تصميم شامل لتوظيف 2281 عيادة على التوالي سواء من العيادات الداخلية أو الخارجية إلى وحدة التنظير في قسم طب المناطق الحارة بمستشفى جامعة الفيوم. تم تسجيل البيانات والمؤشرات الديموغرافية لمنظار الجهاز الهضمي العلوي. تم تسجيل نتائج التنظير الداخلي لكل مشارك.

أظهرت نتائجنا أن الفئة العمرية الرئيسية كانت بين 41- 60 سنة بنسبة 37.6% ، وكانت نسبة الذكور إلى الإناث متساوية تقريباً. وكان أكثر الأعراض شيوعاً هو الألم فوق المعدي وحرقة في المعدة بنسبة 31.9% ، وكان امراض التقرح المعدي أكثر نتائج التنظير الداخلي شيوعاً إما

التهاب المعدة أو التهاب المعدة التآكلي والتهاب المعدة والاثنى عشر وقرحة المعدة التي قد تكون ناجمة عن نمط الحياة والبكتيريا الحلزونية والاستخدام غير المناسب لمسكنات الألم بين مجتمعنا.

كانت دوالي المريء هي أكثر الأمراض شيوعاً على مستوى المريء ، وقد يكون هذا بسبب ارتفاع معدل انتشار التهاب الكبد الوبائي في مصر.

يمنحنا الدور العلاجي لمنظار الجهاز الهضمي القدرة على مساعدة مريضنا إما من خلال اخذ عينة و التي تساعد في التمييز بين طبيعة الأمراض أو السيطرة على حالات نزيف الجهاز الهضمي العلوي من خلال إدارة نزيف الدوالي باستخدام الربط أو العلاج بالتصليب بالحقن أو نزيف الأوعية الدموية من خلال جهاز الكي الارجوني. كما يساعد توسيع تضيق المريء في بعض الحالات في دراستنا.