

رقعة الغللة الغمدية من أجل إصلاح الإحليل الجلدي المتكرر بعد عملية تجميل الإحليل التحتاني

الأهداف: تقييم نتائج إصلاح ناسور الإحليل الجلدي المتكرر باستخدام رقعة الغللة الغمدية كطبقة واقية وسيطة. **الأساليب:** استعرضنا بأثر رجعي بيانات ٤٥ طفلاً يعانون من ناسور إحليل جلدي متكرر وتم تصليحه باستخدام رقعة الغللة الغمدية كطبقة واقية وسيطة بين فبراير ٢٠١١ ويناير ٢٠١٩. وقد تم إجراء الإصلاح بعد ٦ أشهر على الأقل من عملية تصليح الناسور السابقة. وتمت المتابعة في العيادة الخارجية على أساس أسبوعي لمدة شهر واحد ، ثم شهرياً لمدة ٦ أشهر ، ثم سنوياً. وفي أثناء المتابعة ، يتم تقييم كل مريض من خلال أخذ التاريخ المرضي. فحص مكان عملية الإصلاح ومشاهدة فعل التبول. وفي بعض الحالات يتم عمل تحليل بول مع تحليل مزرعة بول وحساسيه. وتعتبر عملية الإصلاح ناجحة في غياب تكرار حدوث الناسور ، مع التبول بقوة جيدة.

النتائج: شملت هذه الدراسة ٤٥ مريضاً يعانون من ناسور إحليل جلدي متكرر وتم تصليحه باستخدام رقعة الغللة الغمدية كطبقة ثانية. متوسط عمر المرضى كان ٦,٧ ± ٢,٨ سنة. كان متوسط الإقامة في المستشفى بعد الجراحة ٥,٥ ± ٧,٠ يوم. وكان الإصلاح ناجحاً في ٤٣ مريضاً (٩٥,٦ ٪) ، وتكرر حدوث الناسور الإحليلي في مريضين (٤,٤ ٪) وتم إصلاحهما بعد ٦ شهور. في جميع المرضى ، كان المظهر التجميلي للقضيبي مرضياً بدون التواء أو اعوجاج بطني بالقضيبي.

الخلاصة: استخدام رقعة الغللة الغمدية كطبقة وسيطة هو إجراء بسيط وسريع. وتعتبر فعالة كطبقة ثانية واقية لإصلاح ناسور الإحليل الجلدي المتكرر.