

البحث الثاني

امان وفعالية عقار التامسولوسين كعلاج طارد للحصوات فى الاطفال
المشتركون في البحث: د/ حسين عبدالحميد الدقادوسي، د/ حسام شاكر، ادم/ محمد سيف
النصر، د/ محمد جابر سليمان

جهة و تاريخ النشر: بحث منشور Arab Journal of Urology فى مجلد (١٣) عدد رقم
(٢) لسنة ٢٠١٥ من صفحة (١٠٧-١١١)

الملخص العربي

الهدف: لتقييم فعالية عقار التامسولوسين كعلاج طارد لحصوات الحالب فى الاطفال اعتمادا على
فعاليته فى الكبار

طريقة البحث: من فبراير ٢٠١٠ الى يوليو ٢٠١٢ ، ضم البحث ٦٧ طفل يعانون من ضيق
طويل حصوات اقل من ١ سم أسفل الحالب حسب الاشعة المقطعة و تم تقسيمهم الى مجموعتين.
الاولى تشمل ٣٣ مريض و تم علاجهم باستخدام عقار التامسولوسين ٤،٠ مجم و عقار
الايبوبروفين. والمجموعة الثانية تشمل ٣٤ مريض و تم علاجهم باستخدام عقار الايبوبروفين.
وتم متابعة الحالات لمدة ٤ اسابيع. واستخدم منظار الحالب فى حالات الألم المستمر، التهابات
الجهاز البولى المتكررة، الحساسية من عقار التامسولوسين، أو عدم نزول الجصوة خلال أربع
اسبوع.

النتائج: أكمل الدراسة ثلاثة وستون مريضا. ولم يوجد اختلاف احصائى بين المجموعتين من
حيث متوسط السن، الوزن، وحجم الحصوة وللتى كان متوسط حجمها ٦،٥٢ (١،٨) مم فى
المجموعة الاولى و كان متوسط حجمها ٦،٤٧ (١،٧٩) مم فى المجموعة الثانية. ولوحظ ان
متوسط الوقت للتخلص من حصوة الحالب فى المجموعة الاولى ٧،٧ (١،٩) يوما وفى الثانية
١٨ (١،٧٣) يوما. كما لوحظ ان الحاجة الى المسكنات اقل احصائيا فى المجموعة الاولى منه فى
المجموعة الثانية. وكانت نسبة التخلص من الحصوة الاولى ٨٧٪ فى المجموعة الاولى مقابل ٦٣٪ فى المجموعة الثانية.

الاستنتاجات: عقار التامسولوسين كعلاج طارد للحصوات فى الاطفال علاج فعال وآمن حيث انه
يسهل التخلص من الحصوة تلقائيا.